

## [Отофа](#)



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Рифамицин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Капли ушные 2.6%** в виде прозрачного раствора красно-желтого цвета.

	<b>100 мл</b>
рифамицин натрия	2.6 г (2 000 000 ME)

*Вспомогательные вещества:* макрогол 400 - 25 г, аскорбиновая кислота - 500 мг, динатрия эдетат - 12 мг, калия дисульфит - 150 мг, лития гидроксид - 135 мг, вода очищенная - до 100 мл.

10 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с дозировочной пипеткой - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Антибиотик из группы рифамицинов для местного применения в оториноларингологии. Механизм действия рифамицина связан с образованием стабильного комплекса с ДНК-зависимой РНК-полимеразой, который препятствует росту бактерий. *Активен в отношении* большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих развитие инфекционно-воспалительных заболеваний наружного и среднего уха.

#### **Фармакокинетика**

Исследования фармакокинетики препарата Отофа не проводились в связи с низкой системной абсорбцией.

### Показания к применению:

Острые и хронические отиты:

- наружный отит;
- острые средние отиты (в т.ч. при перфорации барабанной перепонки);
- хронические средние отиты;
- состояния после оперативных вмешательств на среднем ухе.

## Относится к болезням:

- [Отит](#)

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к рифамицину.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым** закапывают в ухо по 5 капель 3 раза/сут или заливают препарат в ухо на несколько минут 2 раза/сут.

**Детям** закапывают в ухо по 3 капли 3 раза/сут или заливают препарат в ухо на несколько минут 2 раза/сут.

Средняя продолжительность курса терапии - 7 дней.

Перед использованием ушных капель рекомендуется согреть флакон, подержав его в руке, во избежание неприятных ощущений, связанных с попаданием холодной жидкости в ухо.

## Побочное действие:

*Редко:* кожные аллергические реакции.

## Передозировка:

В связи с низкой степенью системной абсорбции передозировка маловероятна.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Адекватных и строго контролируемых клинических исследований безопасности применения препарата Отофа при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не проводилось.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого лекарственного взаимодействия препарата Отофа с другими лекарственными средствами не выявлено.

## Особые указания и меры предосторожности:

Препарат придает розовую окраску барабанной перепонке (видимую при отоскопии).

Следует избегать контактов препарата с одеждой, т.к. раствор может оставлять пятна на ткани.

### **Применение в детском возрасте**

Возможно применение по показаниям и в дозах, учитывающих возраст пациента.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C.

**Отофа**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Срок годности:**

3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Otofa>