

## Отривин (спрей)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Ксилометазолин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

◇ **Спрей назальный дозированный (для детей) 0.05%** в виде прозрачного бесцветного раствора, практически без запаха.

	<b>1 мл</b>
ксилометазолина гидрохлорид	500 мкг

*Вспомогательные вещества:* натрия дигидрофосфата дигидрат - 5 мг, натрия гидрофосфата додекагидрат - 1.7 мг, динатрия эдетат - 500 мкг, бензалкония хлорид (в форме 50% раствора - 100 мкг) - 50 мкг, сорбитол 70% - 20 мг, гипромеллоза 4 тыс. - 5 мг, натрия хлорид - 4 мг, вода - до 1 мл.

10 мл - флаконы из полиэтилена высокой плотности с дозирующим устройством (1) в комплекте с наконечником и защитным колпачком - пачки картонные.

◇ **Спрей назальный дозированный 0.1%** в виде прозрачного бесцветного раствора, практически без запаха.

	<b>1 мл</b>
ксилометазолина гидрохлорид	1 мг

*Вспомогательные вещества:* натрия дигидрофосфата дигидрат - 5 мг, натрия гидрофосфата додекагидрат - 1.7 мг, динатрия эдетат - 500 мкг, бензалкония хлорид (в форме 50% раствора) - 100 мкг, сорбитол 70% - 20 мг, гипромеллоза-4 тыс. - 5 мг, натрия хлорид - 4 мг, вода очищенная - до 1 мл.

10 мл - флаконы из полиэтилена высокой плотности с дозирующим устройством (1) с наконечником и защитным колпачком из полиэтилена - пачки картонные.

15 мл - флаконы из полиэтилена высокой плотности с дозирующим устройством (1) с наконечником и защитным колпачком из полиэтилена - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Сосудосуживающий препарат для местного применения в ЛОР-практике (деконгестант). Ксилометазолин оказывает альфа-адреномиметическое действие. Вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой оболочки носа, устраняя отек и гиперемия слизистой оболочки носоглотки. Облегчает носовое дыхание при ринитах.

Отривин хорошо переносится пациентами с чувствительной слизистой оболочкой, его воздействие не препятствует отделению слизи. Препарат имеет сбалансированное значение pH, характерное для полости носа.

В состав препарата входят неактивные компоненты - сорбитол и гипромеллоза, которые являются увлажнителями, что позволяет уменьшить симптомы раздражения и сухости слизистой оболочки носа, возникающие при длительном использовании ксилометазолина.

В терапевтических концентрациях препарат не раздражает слизистую оболочку, не вызывает гиперемии.

Фармакологическое действие наступает через несколько минут после применения и продолжается в течение 12 ч.

### Фармакокинетика

При местном применении практически не абсорбируется, концентрации в плазме настолько малы, что их невозможно определить современными аналитическими методами.

## Показания к применению:

- острые респираторные заболевания с явлениями ринита;
- острый аллергический ринит;
- поллиноз;
- синусит;
- евстахиит;
- средний отит (для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки);
- подготовка больного к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.

## Относится к болезням:

- [Аллергический ринит](#)
- [Аллергия](#)
- [Евстахиит](#)
- [Острые респираторные заболевания](#)
- [Отит](#)
- [Поллиноз](#)
- [Ринит](#)
- [Синусит](#)

## Противопоказания:

- артериальная гипертензия;
- тахикардия;
- выраженный атеросклероз;
- глаукома;
- атрофический ринит;
- гипертиреоз;
- хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* применяют у пациентов с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гиперплазией предстательной железы, при повышенной чувствительности к адренергическим препаратам, сопровождающейся симптомами бессонницы, головокружения, сердечной аритмии, тремора, повышенного АД.

## **Способ применения и дозы:**

Спрей назальный назначают **взрослым и детям старше 6 лет** по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход (при необходимости можно применять повторно), обычно бывает достаточно 3-4 впрыскиваний в сутки.

*Спрей назальный дозированный (для детей) 0.05%* назначают **грудным детям и детям в возрасте до 6 лет** по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 1-2 раза/сут, не следует применять более 3 раз/сут; **детям старше 6 лет** назначают по 2-3 впрыскивания в каждый носовой ход 3-4 раза/сут.

Длительность применения - не более 10 дней подряд.

## **Побочное действие:**

*Местные реакции:* при частом и/или длительном применении - раздражение и/или сухость слизистой оболочки носоглотки, жжение, покалывание, чиханье, гиперсекреция; редко - отек слизистой оболочки носа.

*Системные реакции:* при частом и/или длительном применении - тошнота; редко - тахикардия, ощущение сердцебиения, аритмия, повышение АД, головная боль, головокружение, рвота, бессонница, нечеткость зрения, аллергические реакции; при длительном применении в высоких дозах - депрессия.

## **Передозировка:**

*Симптомы:* усиление побочных эффектов (повышение АД, учащение пульса, иногда - спутанность сознания).

*Лечение:* проведение симптоматической терапии.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

При беременности и в период лактации препарат следует применять только после тщательной оценки соотношения риска и пользы для матери и плода, не допускается превышения рекомендуемых доз.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Несовместим с ингибиторами MAO и трициклическими антидепрессантами.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Не следует превышать рекомендуемые дозы и длительность применения препарата, особенно у детей и пожилых пациентов.

При использовании препарата у детей до 1 года необходима консультация врача.

У детей в возрасте до 6 лет препарат следует применять под наблюдением взрослых.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Ксилометазолин не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

### **Применение в пожилом возрасте**

Не следует превышать рекомендуемые дозы и длительность применения препарата, особенно у пожилых пациентов.

### **Применение в детском возрасте**

Не следует превышать рекомендуемые дозы и длительность применения препарата, особенно у детей.

**Отривин (спрей)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

При использовании препарата у детей до 1 года необходима консультация врача.

У детей в возрасте до 6 лет препарат следует применять под наблюдением взрослых.

**Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C. Срок годности – 3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Otrivin\\_sprey](http://drugs.thead.ru/Otrivin_sprey)