Оттославин



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Борная кислота
- Прокаин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капли ушные	**1 мл**
борная кислота	30 мг
прокаин	20 мг

15 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.
25 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фармакологическое действие обусловлено составом препарата. Применяемый местно раствор, оказывает антисептическое действие и умеренно облегчает боль.

Показания к применению:

— наружный острый и хронический отит без повреждения барабанной перепонки.

Относится к болезням:

- Отит

Противопоказания:

— беременность;

— период грудного вскармливания;

— детский возраст до 1 года;

— хроническая почечная недостаточность;

— нарушение целостности барабанной перепонки;

— индивидуальная непереносимость.

Способ применения и дозы:

Перед использованием ушных капель рекомендуется согреть флакон, подержав его в руке, во избежание неприятных ощущений, связанных с попаданием холодной жидкости в ухо. Капли следует закапывать больному, лежащему с повернутым вверх ухом; после процедуры больной должен в течение нескольких минут оставаться в этом положении. Взрослые - 2-3 капли в ухо 2-3 раза в день.

Дети - 1-2 капли 2-3 раза в день. Может применяться в виде тампонов, смоченных раствором, которые вводят в слуховой проход.

Побочное действие:

Аллергические реакции, при длительном применении может наблюдаться головная боль, тошнота, рвота, диарея, в редких случаях шоковое состояние.

При использовании препарата, возможны местные реакции в виде зуда, жжения, которые проходят самостоятельно через 1-2 минуты и не требуют отмены препарата.

Передозировка:

При передозировке, длительном применении и при нарушениях функции почек, возможно возникновение острых и хронических токсических реакций: тошноты, рвоты, диареи, кожной сыпи, головной боли, спутанности сознания, нарушения мочевыделения, в редких случаях шоковое состояние.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан в время беременности и в период грудного вскармливания

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказан при хронической почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 1 года.

Условия хранения:

В защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С, вдали от огня.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ottoslavin