

Оттославин



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Борная кислота](#)
- [Прокаин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [МНН](#) [Википедия](#)^{МНН} [МНН](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капли ушные	1 мл
борная кислота	30 мг
прокаин	20 мг

15 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.

25 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фармакологическое действие обусловлено составом препарата. Применяемый местно раствор, оказывает антисептическое действие и умеренно облегчает боль.

Показания к применению:

— наружный острый и хронический отит без повреждения барабанной перепонки.

Относится к болезням:

- [Отит](#)

Противопоказания:

- беременность;
- период грудного вскармливания;
- детский возраст до 1 года;

- хроническая почечная недостаточность;
- нарушение целостности барабанной перепонки;
- индивидуальная непереносимость.

Способ применения и дозы:

Перед использованием ушных капель рекомендуется согреть флакон, подержав его в руке, во избежание неприятных ощущений, связанных с попаданием холодной жидкости в ухо. Капли следует закапывать больному, лежащему с повернутым вверх ухом; после процедуры больной должен в течение нескольких минут оставаться в этом положении. Взрослые - 2-3 капли в ухо 2-3 раза в день.

Дети - 1-2 капли 2-3 раза в день. Может применяться в виде тампонов, смоченных раствором, которые вводят в слуховой проход.

Побочное действие:

Аллергические реакции, при длительном применении может наблюдаться головная боль, тошнота, рвота, диарея, в редких случаях шоковое состояние.

При использовании препарата, возможны местные реакции в виде зуда, жжения, которые проходят самостоятельно через 1-2 минуты и не требуют отмены препарата.

Передозировка:

При передозировке, длительном применении и при нарушениях функции почек, возможно возникновение острых и хронических токсических реакций: тошноты, рвоты, диареи, кожной сыпи, головной боли, спутанности сознания, нарушения мочевыделения, в редких случаях шоковое состояние.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан в время беременности и в период грудного вскармливания

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказан при хронической почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 1 года.

Условия хранения:

В защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C, вдали от огня.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Оттославин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Источник: <http://drugs.thead.ru/Ottoslavin>