

[ПРИМАФУНГИН \(свечи\)](#)



Код АТХ:

- [G01AA02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Натамицин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Суппозитории вагинальные цилиндрической формы, от светло-желтого до желтого или желтого с кремовым оттенком цвета; на срезе допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

| | |
|-----------|----------------|
| | 1 супп. |
| Натамицин | 100 мг |

Вспомогательные вещества: цетиловый спирт 390 мг, сорбитана триолеат 460 мг, полисорбат 80 460 мг, натрия гидрокарбонат 69 мг, адипиновая кислота 64 мг, Суппоцир АМ (полусинтетические глицериды) - достаточное количество для получения суппозитория массой 2.5 г.

3 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Показания к применению:

— грибковые поражения вульвы и влагалища;

— с профилактической целью при лечении цитостатиками, глюкокортикоидами или антибиотиками широкого спектра.

Относится к болезням:

- [Вульвит](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Интравагинально. У **взрослых и девушек (после начало половой жизни)** назначают по 1 суппозиторию в течение 3-6 дней.

Суппозиторий вводят во влагалище, в положении лежа, как можно глубже, 1 раз/сут на ночь. Суппозитории не следует резать на части, поскольку подобное изменение условий хранения препарата может привести к нарушению распределения активного вещества.

Побочное действие:

Местные реакции: легкое раздражение слизистой, ощущение жжения.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Примафунгин не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата Примафунгин в период беременности и лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Примафунгин не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

В период менструаций терапию суппозиториями прерывают.

В период лечения суппозиториями нет необходимости в исключении половых контактов. Однако рекомендуется провести обследование половых партнеров и, в случае выявления кандидозного поражения, провести курс лечения партнера. Также следует предусмотреть использование в период лечения барьерных контрацептивов.

Цетиловый спирт, который входит в состав вагинальных суппозиториев, может вызвать чувство легкого жжения в генитальной области при повышенной чувствительности к данному компоненту.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Применение препарата не влияет на способность к вождению и управлению потенциально опасными механизмами.

Условия хранения:

Препарат хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре от 15° до 25°С. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

ПРИМАФУНГИН (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/PRIMAFUNGIN_svechi