Панавир



Код АТХ:

- J05AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Полисахариды побегов Solanum tuberosum

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противовирусное средство растительного происхождения. Высокомолекулярный полисахарид, относящийся к классу гексозных гликозидов. Повышает неспецифическую резистентность организма к различным инфекциям и способствует индукции синтеза интерферона.

Фармакокинетика

При в/в введении полисахариды определяются в крови уже через 5 мин после введения, захватываются клетками РЭС, печени и селезенки. Через 20-30 мин обнаруживаются в моче и выдыхаемом воздухе.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии клещевого энцефалита (снижение вирусной нагрузки и снятие неврологической

симптоматики, в т.ч. анизорефлексия, снижение рефлексов, болезненность точек выхода черепно-мозговых нервов, нистагм).

В составе комплексной терапии: герпесвирусные инфекции различной локализации (в т.ч. рецидивирующий генитальный герпес, Herpes zoster и офтальмогерпес).

Снижение иммунитета в сочетании с инфекционными заболеваниями.

Цитомегаловирусная инфекция в сочетании с привычным невынашиванием беременности.

В составе комплексной терапии: папилломавирусная инфекция (аногенитальные бородавки).

Относится к болезням:

- Герпес
- Инфекции
- Неврит
- Неврозы
- Нистагм
- Папиллит
- Энцефалит

Противопоказания:

Тяжелые заболевания почек и селезенки, период лактации, детский возраст, повышенная чувствительность к растительному средству.

Способ применения и дозы:

В/в струйно медленно, по 200 мкг.
При клещевом энцефалите вводят 2 раза с интервалом 48 или 24 ч. При необходимости через 1 мес курс лечения повторяют.

При ЦМВ или папилломавирусной инфекции вводят 3 раза с интервалом в 48 ч в течение 1-й недели и 2 раза с интервалом в 72 ч в течение 2 недели.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью применять при беременности. Противопоказан в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказан при тяжелых заболеваниях почек.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте.

Источник: http://drugs.thead.ru/Panavir