

## [Панавир \(раствор\)](#)



### **Код АТХ:**

- [J05AX](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Полисахариды побегов Solanum tuberosum](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр<sup>МНН</sup>](#) [Википедия<sup>МНН</sup>](#)

[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>](#)

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Противовирусное средство растительного происхождения. Высокомолекулярный полисахарид, относящийся к классу гексозных гликозидов. Повышает неспецифическую резистентность организма к различным инфекциям и способствует индукции синтеза интерферона.

#### **Фармакокинетика**

При в/в введении полисахариды определяются в крови уже через 5 мин после введения, захватываются клетками РЭС, печени и селезенки. Через 20-30 мин обнаруживаются в моче и выдыхаемом воздухе.

### **Показания к применению:**

В составе комплексной терапии клещевого энцефалита (снижение вирусной нагрузки и снятие неврологической

симптоматики, в т.ч. анизорефлексия, снижение рефлексов, болезненность точек выхода черепно-мозговых нервов, нистагм).

В составе комплексной терапии: герпесвирусные инфекции различной локализации (в т.ч. рецидивирующий генитальный герпес, Herpes zoster и офтальмогерпес).

Снижение иммунитета в сочетании с инфекционными заболеваниями.

Цитомегаловирусная инфекция в сочетании с привычным невынашиванием беременности.

В составе комплексной терапии: папилломавирусная инфекция (аногенитальные бородавки).

## **Относится к болезням:**

- [Герпес](#)
- [Инфекции](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Нистагм](#)
- [Папиллит](#)
- [Энцефалит](#)

## **Противопоказания:**

Тяжелые заболевания почек и селезенки, период лактации, детский возраст, повышенная чувствительность к растительному средству.

## **Способ применения и дозы:**

В/в струйно медленно, по 200 мкг.

При клещевом энцефалите вводят 2 раза с интервалом 48 или 24 ч. При необходимости через 1 мес курс лечения повторяют.

При ЦМВ или папилломавирусной инфекции вводят 3 раза с интервалом в 48 ч в течение 1-й недели и 2 раза с интервалом в 72 ч в течение 2 недели.

## **Побочное действие:**

Возможно: аллергические реакции.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

С осторожностью применять при беременности. Противопоказан в период лактации.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

### **При нарушениях функции почек**

Противопоказан при тяжелых заболеваниях почек.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан в детском возрасте.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Panavir\\_rastvor](http://drugs.thead.ru/Panavir_rastvor)