

## [Панциол](#)



### **Код АТХ:**

- [A13A](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Пантов северного оленя экстракт](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Нейротропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Адаптогенное средство. Оказывает стимулирующее действие на ЦНС и сердечно-сосудистую систему, повышает тонус скелетных мышц, двигательную активность кишечника. Содержит фосфолипиды и микроэлементы, повышает работоспособность и нормализует АД при артериальной гипотензии, стимулирует деятельность органов ЖКТ.

### **Показания к применению:**

Астения.

В составе комплексной терапии - неврастения, артериальная гипотензия.

### **Относится к болезням:**

- [Астения](#)
- [Гипотензия](#)
- [Неврит](#)

### **Противопоказания:**

Выраженный атеросклероз, хроническая сердечная недостаточность, стенокардия, гиперкоагуляция, нефрит (тяжелые формы), диарея, артериальная гипертензия, злокачественные новообразования.

### **Способ применения и дозы:**

Внутрь, за 30 мин до еды, 2-3 раза/сут в течение 2-3 нед. Интервал между курсами - 10 дней. При необходимости через 5-7 дней курс лечения можно повторить (обычно до 3 раз в год).

Вводят п/к и в/м - по 1-2 мл/сут; курс лечения - 15-20 дней, проводят 2-3 курса с перерывом в 10 дней.

### **Побочное действие:**

*Возможно:* аллергические реакции (кожный зуд), повышение АД, головная боль.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не следует назначать с антикоагулянтами, солями кальция и средствами, стимулирующими перистальтику кишечника.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

#### ***При нарушениях функции почек***

Противопоказан при нефрите (тяжелых формах).

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Panciol>