## Панцитрат



### Код АТХ:

A09AA02

# Международное непатентованное название (Действующее вещество):

Панкреатин

#### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр $^{\mathrm{MHH}}$  Википедия $^{\mathrm{MHH}}$  РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com $^{\mathrm{ahr}}$ 

### Форма выпуска:

Reprise the responsible to the responsibility to the responsibilit	
	1 капс.
панкреатин	10 тыс. ЕД
с ферментативной активностью:	
липазы	10000 ЕД. Ph. Eur.
амилазы	9000 ЕД. Ph. Eur.
протеаз	500 ЕД. Ph. Eur.

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кросповидон, аэросил, магния стеарат, сополимер метакриловой кислоты и этилакрилата, триэтилцитрат, тальк, симетикон 23% эмульсия, монтан гликоль воск, желатин, титана диоксид, железа оксид красный, железа оксид черный.

20 шт. - флаконы (1) - пачки картонные. 50 шт. - флаконы (1) - пачки картонные. 100 шт. - флаконы (1) - пачки картонные.

◊ Капсулы твердые желатиновые, размер №0, продолговатые, с коричневым колпачком и бесцветным прозрачным корпусом; содержимое капсул — выпуклые микротаблетки, покрытые пленкой беловато-серого цвета.

корпусом, содержимое капсул — выпуклые микротаолетки, покрытые пленкой беловато-серого цвета.	
	1 капс.
панкреатин	25 тыс. ЕД
с ферментативной активностью:	
липазы	25000 ЕД. Ph. Eur.
амилазы	22500 ЕД. Ph. Eur.
протеаз	1250 ЕД. Ph. Eur.

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кросповидон, аэросил, магния стеарат, сополимер метакриловой кислоты и этилакрилата, триэтилцитрат, тальк, симетикон 23% эмульсия, монтан гликоль воск, желатин, титана диоксид, железа оксид красный, железа оксид черный.

20 шт. - флаконы (1) - пачки картонные. 50 шт. - флаконы (1) - пачки картонные. 100 шт. - флаконы (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

• Метаболики

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Ферментный препарат. Компенсирует недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы, оказывает протеолитическое, амилолитическое и липолитическое действие. Улучшает функциональное состояние ЖКТ, нормализует процессы пищеварения.

Входящие в состав панкреатина ферменты (липаза, альфа-амилаза, трипсин, химотрипсин) способствуют расщеплению белков до аминокислот, жиров до глицерина и жирных кислот, крахмала до декстринов и моносахаридов. Трипсин ингибирует стимулированную секрецию поджелудочной железы, оказывая анальгетическое действие.

Капсулы содержат микротаблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой. Панкреатические ферменты высвобождаются из лекарственной формы в щелочной среде тонкого отдела кишечника, поскольку защищены от действия желудочного сока оболочкой.

#### Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Панцитрат не предоставлены.

#### Показания к применению:

- заместительная терапия при внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы (в т.ч. при хроническом панкреатите, состоянии после облучения, диспепсии, синдроме Ремхельда, муковисцидозе, метеоризме, диарее неинфекционного генеза, после панкреатэктомии);
- при нарушении усвоения пищи после резекции желудка и/или тонкого отдела кишечника;
- для улучшения переваривания пищи у лиц с нормальной функцией ЖКТ в случае погрешности в питании (в т.ч. при нерегулярном питании, употреблении большого количества пищи, употреблении жирной пищи, нарушениях жевательной функции, малоподвижном образе жизни, длительной иммобилизации);
- подготовка к рентгенологическому и ультразвуковому исследованию органов брюшной полости.

#### Относится к болезням:

- Диарея
- Диспепсия
- Метеоризм
- Муковисцидоз
- Панкреатит

#### Противопоказания:

- острый панкреатит;
- обострение хронического панкреатита;
- детский возраст до 6 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь во время или после еды, не разжевывая и запивая нещелочной жидкостью (вода, фруктовые соки).

Доза определяется в зависимости от степени нарушения пищеварения. **Взрослым** назначают по 1-2 капс. (по 10 000 ЕД) или по 1 капс. (по 25 000 ЕД) 3 раза/сут. У **детей старше 6 лет** препарат применяется по назначению врача, доза

определяется индивидуально.

Продолжительность лечения может варьировать от нескольких дней (при нарушении процесса пищеварения вследствие погрешностей в диете) до нескольких месяцев или лет (при необходимости постоянной заместительной терапии).

### Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: редко - диарея, запор, ощущение дискомфорта в области желудка, тошнота (причинно-следственная связь развития этих реакций с действием панкреатина не установлена, поскольку указанные явления относятся к симптомам внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы).

При длительном применении в высоких дозах: возможно - гиперурикозурия, гиперурикемия.

При муковисцидозе в случае превышения необходимой дозы панкреатина: возможно - стриктуры (фиброзная колонопатия) в илеоцекальном отделе восходящей ободочной кишки.

*При применении в высоких дозах у детей:* возможно - перианальное раздражение, раздражение слизистой оболочки полости рта.

Прочие: аллергические реакции.

### Передозировка:

Симптомы: гиперурикозурия, гиперурикемия; у детей - запор.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение панкреатина при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не противопоказано.

# Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При применении панкреатина возможно снижение всасывания железа и фолиевой кислоты.

Одновременное применение антацидных средств, содержащих кальция карбонат и/или магния гидроксид, может привести к снижению эффективности панкреатина.

### Особые указания и меры предосторожности:

При муковисцидозе не рекомендуется применение панкреатина в высоких дозах вследствие повышения риска развития стриктур (фиброзной колонопатии).

Доза должна быть адекватна количеству ферментов, необходимому для всасывания жиров с учетом качества и количества потребляемой пищи.

Использование в педиатрии

Противопоказано применение препарата у детей до 6 лет.

#### Применение в детском возрасте

У детей старше 6 лет препарат применяется по назначению врача, доза определяется индивидуально.

Детям до 6 лет препарат противопоказан.

### Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 20°С.

# Срок годности:

3 года.

# Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Pancitrat