

## Панкреофлат



### Код АТХ:

- [A09AA02](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки, покрытые оболочкой** белого или почти белого цвета, продолговатой формы.

	<b>1 таб.</b>
панкреатин	170 мг,
с ферментативной активностью:	
протеолитической	400 Ед Евр. Ф.
амилолитической	5500 Ед Евр. Ф.
липолитической	6500 Ед Евр. Ф.
диметикон	80 мг

*Вспомогательные вещества:* кремния диоксид коллоидный, сорбиновая кислота, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, сухого молока порошок, гипромеллоза, акации камедь, коповидон К 28.

*Состав оболочки:* акации камедь, коповидон К 28, магния оксид (легкий), кремния диоксид коллоидный, повидон, сахароза, шеллак, тальк, титана диоксид (Е171), макрогол 6000, натрия кармеллоза 2000, капол 1295 (пчелиный воск, карнаубский воск).

25 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.  
25 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
25 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.  
25 шт. - блистеры (8) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Ферментный препарат. Компенсирует недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы.

Панкреатин - порошок поджелудочной железы свиньи, содержащий ферменты: липазу, альфа-амилазу, трипсин, химотрипсин и др.

Липаза отщепляет жирные кислоты по позициям 1 и 3 триглицеридов. Свободные жирные кислоты, образующиеся

## Панкреофлат

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

при этом расщеплении, всасываются, главным образом, из верхнего отдела тонкой кишки при участии желчных кислот.

Трипсин образуется из трипсиногена под действием энтерокиназы в тонкой кишке. Он расщепляет связи между пептидами, в которых принимали участие в основном лизин или аргинин. По результатам клинических исследований трипсин ингибирует секрецию поджелудочной железы по механизму обратной связи. Полагают, что болеутоляющий эффект панкреатина, описанный в некоторых исследованиях связан именно с этим.

Альфа-амилаза, как и эндоамилаза, расщепляет полисахариды, содержащие глюкозу.

Диметикон, входящий в состав Панкреофлата, устраняет повышенное накопление газа в тонком кишечнике. Он является химически инертным веществом, механизм действия которого основан на изменении поверхностного натяжения пузырьков газа в кишечнике. Эти пузырьки лопаются, и газ, находящийся в них, высвобождается, после чего всасывается или выводится естественным путем.

### Фармакокинетика

Панкреатин и диметикон не всасываются из ЖКТ.

### Показания к применению:

- нарушение функции поджелудочной железы (недостаточность внешнесекреторной функции), например, хронические панкреатиты и ахилия желудка;
- нарушения пищеварения в случае заболеваний печени и желчевыводящих путей;
- нарушение пищеварения после операций на желудке и тонкой кишке, особенно, если эти заболевания связаны с повышенным газообразованием и скоплением газов в кишечнике (метеоризм).

### Относится к болезням:

- [Метеоризм](#)
- [Панкреатит](#)

### Противопоказания:

- детский возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

*С осторожностью* препарат следует назначать на ранних стадиях острого панкреатита и при обострении хронического, а также при непереносимости галактозы, лактазной недостаточности и нарушениях всасывания глюкозы-галактозы.

### Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости, во время или после еды.

**Взрослым** назначают по 1-2 таб. с каждым приемом пищи.

**Детям в возрасте 12 лет и старше** режим дозирования устанавливают индивидуально.

Продолжительность курса лечения определяется лечащим врачом.

### Побочное действие:

*Дерматологические реакции:* возможны аллергические реакции (в случае непереносимости какого-либо компонента препарата).

*Со стороны пищеварительной системы:* боли в животе, дискомфорт в области желудка, запор, диарея, тошнота, рвота, гиперурикозурия, повышение уровня мочевой кислоты в плазме крови.

## **Передозировка:**

Данных о случаях передозировки препарата Панкреофлат нет.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Данных о токсическом действии на репродуктивную функцию и развитие плода нет.

Однако поскольку безопасность применения препарата Панкреофлат при беременности и в период лактации изучена недостаточно, следует соблюдать осторожность при его назначении.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Одновременное применение антацидных препаратов, содержащих магния карбонат и/или алюминия гидроксид, может привести к снижению эффективности диметикона.

Не было отмечено клинически значимого взаимодействия панкреатина с другими лекарственными средствами.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

### ***При нарушениях функции печени***

Возможно использование по показаниям

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказание: детский возраст до 12 лет.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 20°C. Срок годности – 2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Pankreoflat>