

## Пантенол-Тева



### **Код АТХ:**

- [D03AX03](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Декспантенол](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

◇ **Мазь для наружного применения 5%** от белого до слегка желтоватого цвета, однородная, с характерным запахом ланолина.

	<b>100 г</b>
декспантенол	5 г

*Вспомогательные вещества:* калия сорбат - 0.15 г, ланолиновый спирт - 20 г, ланолин - 10 г, парафин мягкий белый - 10 г, изооктадеканолдиглицеролсукцинат - 3 г, триглицериды среднецепочные - 4 г, натрия цитрат - 0.3 г, лимонной кислоты моногидрат - 0.2 г, вода очищенная - 47.35 г.

35 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

[1] - Инструкция по медицинскому применению одобрена фармакологическим комитетом МЗ РФ 15.11.2000 г.

Действующим веществом препарата Пантенол—ратиофарм является декспантенол.

Декспантенол является аналогом пантеноловой кислоты и обладает действием, подобным действию пантеноловой кислоты.

Пантеноловая кислота является водорастворимым витамином, который участвует в многочисленных процессах обмена веществ, являясь составной частью коэнзима А.

#### **Фармакокинетика**

При наружном применении декспантенол возмещает повышенную потребность поврежденной кожи в пантотеновой кислоте. Оказывает положительное влияние на образование и функцию эпителиальной ткани, обладает некоторой противовоспалительной активностью.

## **Показания к применению:**

Препарат Пантенол-ратиофарм применяется местно для лечения поверхностных небольших повреждений кожи и мягких тканей:

- ссадины;
- ожоги;
- асептические послеоперационные раны;
- плохо заживающие кожные трансплантаты;
- трофические язвы голени;
- солнечные ожоги;
- дерматиты.

## **Относится к болезням:**

- [Дерматит](#)
- [Ожоги](#)
- [Раны](#)
- [Ссадины](#)
- [Трофические язвы](#)

## **Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Способ применения и дозы:**

Лечение плохо заживающих кожных трансплантатов и трофических язв должно проводиться под наблюдением лечащего врача.

Длительность лечения зависит от особенностей течения заболевания и тяжести состояния.

Препарат наносят тонким слоем на пораженные участки один или несколько раз в день.

При необходимости больной должен обратиться к лечащему врачу для решения вопроса о продолжительности лечения.

## **Побочное действие:**

В единичных случаях возможны проявления индивидуальной непереносимости в виде кожных аллергических реакций.

## **Передозировка:**

Даже при случайном приеме препарата внутрь явления интоксикации не наблюдались.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат не имеет противопоказаний при применении во время беременности и в период кормления грудью.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

До настоящего времени реакций взаимодействия с другими лекарственными средствами не наблюдалось.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При применении препарата Пантенол-ратиофарм в генитальной или анальной областях следует иметь в виду, что наличие вазелина в составе препарата может привести к риску разрывов презервативов из латекса из-за снижения их прочности и, соответственно, возникновения риска при использовании такой контрацепции.

## **Условия хранения:**

Специальных требований к хранению нет. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять после истечения срока годности.

После вскрытия тубы препарат годен для применения в течение 3 мес.

Срок годности — 3 г.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Pantenol-Teva>