

Пантенол-Тева



Код АТХ:

- [D03AX03](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Декспантенол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения 5%** от белого до слегка желтоватого цвета, однородная, с характерным запахом ланолина.

	100 г
декспантенол	5 г

Вспомогательные вещества: калия сорбат - 0.15 г, ланолиновый спирт - 20 г, ланолин - 10 г, парафин мягкий белый - 10 г, изооктадеканолдиглицеролсукцинат - 3 г, триглицериды среднецепочные - 4 г, натрия цитрат - 0.3 г, лимонной кислоты моногидрат - 0.2 г, вода очищенная - 47.35 г.

35 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

[1] - Инструкция по медицинскому применению одобрена фармакологическим комитетом МЗ РФ 15.11.2000 г.

Действующим веществом препарата Пантенол—ратиофарм является декспантенол.

Декспантенол является аналогом пантеноловой кислоты и обладает действием, подобным действию пантеноловой кислоты.

Пантеноловая кислота является водорастворимым витамином, который участвует в многочисленных процессах обмена веществ, являясь составной частью коэнзима А.

Фармакокинетика

При наружном применении декспантенол возмещает повышенную потребность поврежденной кожи в пантотеновой кислоте. Оказывает положительное влияние на образование и функцию эпителиальной ткани, обладает некоторой противовоспалительной активностью.

Показания к применению:

Препарат Пантенол-ратиофарм применяется местно для лечения поверхностных небольших повреждений кожи и мягких тканей:

- ссадины;
- ожоги;
- асептические послеоперационные раны;
- плохо заживающие кожные трансплантаты;
- трофические язвы голени;
- солнечные ожоги;
- дерматиты.

Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Ожоги](#)
- [Раны](#)
- [Ссадины](#)
- [Трофические язвы](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Лечение плохо заживающих кожных трансплантатов и трофических язв должно проводиться под наблюдением лечащего врача.

Длительность лечения зависит от особенностей течения заболевания и тяжести состояния.

Препарат наносят тонким слоем на пораженные участки один или несколько раз в день.

При необходимости больной должен обратиться к лечащему врачу для решения вопроса о продолжительности лечения.

Побочное действие:

В единичных случаях возможны проявления индивидуальной непереносимости в виде кожных аллергических реакций.

Передозировка:

Даже при случайном приеме препарата внутрь явления интоксикации не наблюдались.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не имеет противопоказаний при применении во время беременности и в период кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

До настоящего времени реакций взаимодействия с другими лекарственными средствами не наблюдалось.

Особые указания и меры предосторожности:

При применении препарата Пантенол-ратиофарм в генитальной или анальной областях следует иметь в виду, что наличие вазелина в составе препарата может привести к риску разрывов презервативов из латекса из-за снижения их прочности и, соответственно, возникновения риска при использовании такой контрацепции.

Условия хранения:

Специальных требований к хранению нет. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять после истечения срока годности.

После вскрытия тубы препарат годен для применения в течение 3 мес.

Срок годности — 3 г.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Pantenol-Teva>