Пантенолспрей



Код АТХ:

- D03AX03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Декспантенол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Аэрозоль для наружного применения 4.63%*** в виде белой пены со слабым кисловатым запахом.

	100 г
декспантенол	4.63 г

Вспомогательные вещества: цетилстеариловый спирт, воск жидкий, парафин жидкий, вода, надуксусная кислота, пропеллент (из смеси трех газов: пропан, изобутан, н-бутан).

130 г - баллоны аэрозольные алюминиевые (1) с клапаном и распылительной насадкой - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат, улучшающий регенерацию тканей, для наружного применения. Активное вещество препарата -

декспантенол - в организме переходит в пантотеновую кислоту, которая, являясь составной частью кофермента А, играет важную роль в процессах ацетилирования и окисления, участвует в углеводном, жировом обмене и в синтезе ацетилхолина. Оказывает некоторое противовоспалительное действие и улучшает регенерацию тканей.

Фармакокинетика

При наружном применении декспантенол быстро абсорбируется в кожу и превращается в пантотеновую кислоту. Связывается с белками плазмы крови (главным образом с бета-глобулином и альбумином).

Показания к применению:

— раны, солнечные и термические ожоги;

— буллезный и пузырчатый дерматит;

— опрелости;

— фурункулы после вскрытия и санации;

— асептические послеоперационные раны, плохо приживающиеся кожные трансплантаты;

— трещины кожи, в т.ч. лечение и профилактика трещин и воспаления сосков молочных желез во время лактации;

— профилактика и лечение опрелостей у грудных детей, активизация процесса заживления кожи при мелких повреждениях, эритемы от пеленок.

Относится к болезням:

- Воспаление
- Дерматит
- Пузырчатка
- Раны
- Фурункул
- Эритема

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют 1 или несколько раз в сутки путем распыления с расстояния 10-20 см так, чтобы вся пораженная поверхность была покрыта препаратом (пеной). Продолжительность курса терапии зависит от тяжести заболевания.

Побочное действие:

Возможно: кожные аллергические реакции.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Пантенолспрей не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата Пантенолспрей при беременности и в период лактации по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Пантенолспрей не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед распылением флакон необходимо тщательно встряхнуть.

При появлении кожных аллергических реакций применение препарата необходимо прекратить.

Ограничений по применению препарата у лиц пожилого возраста не существует.

Баллон находится под давлением. Следует оберегать от попадания прямых солнечных лучей и температуры выше 50°C. После окончания применения баллон нельзя вскрывать и сжигать. Не распылять вблизи открытого огня или на раскаленные предметы.

Использование в педиатрии

Ограничений по применению препарата у детей не существует.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C, вдали от источников воспламенения.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Pantenolsprey