

Пантенолспрей



Код АТХ:

- [D03AX03](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Декспантенол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Аэрозоль для наружного применения 4.63%** в виде белой пены со слабым кислотным запахом.

	100 г
декспантенол	4.63 г

Вспомогательные вещества: цетилстеариловый спирт, воск жидкий, парафин жидкий, вода, надуксусная кислота, пропеллент (из смеси трех газов: пропан, изобутан, н-бутан).

130 г - баллоны аэрозольные алюминиевые (1) с клапаном и распылительной насадкой - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат, улучшающий регенерацию тканей, для наружного применения. Активное вещество препарата -

Пантенолспрей

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

декспантенол - в организме переходит в пантотеновую кислоту, которая, являясь составной частью кофермента А, играет важную роль в процессах ацетилирования и окисления, участвует в углеводном, жировом обмене и в синтезе ацетилхолина. Оказывает некоторое противовоспалительное действие и улучшает регенерацию тканей.

Фармакокинетика

При наружном применении декспантенол быстро абсорбируется в кожу и превращается в пантотеновую кислоту. Связывается с белками плазмы крови (главным образом с бета-глобулином и альбумином).

Показания к применению:

- раны, солнечные и термические ожоги;
- буллезный и пузырчатый дерматит;
- опрелости;
- фурункулы после вскрытия и санации;
- асептические послеоперационные раны, плохо приживающиеся кожные трансплантаты;
- трещины кожи, в т.ч. лечение и профилактика трещин и воспаления сосков молочных желез во время лактации;
- профилактика и лечение опрелостей у грудных детей, активизация процесса заживления кожи при мелких повреждениях, эритемы от пеленок.

Относится к болезням:

- [Воспаление](#)
- [Дерматит](#)
- [Пузырчатка](#)
- [Раны](#)
- [Фурункул](#)
- [Эритема](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют 1 или несколько раз в сутки путем распыления с расстояния 10-20 см так, чтобы вся пораженная поверхность была покрыта препаратом (пенной). Продолжительность курса терапии зависит от тяжести заболевания.

Побочное действие:

Возможно: кожные аллергические реакции.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Пантенолспрей не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата Пантенолспрей при беременности и в период лактации по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Пантенолспрей не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед распылением флакон необходимо тщательно встряхнуть.

При появлении кожных аллергических реакций применение препарата необходимо прекратить.

Ограничений по применению препарата у лиц пожилого возраста не существует.

Баллон находится под давлением. Следует оберегать от попадания прямых солнечных лучей и температуры выше 50°C. После окончания применения баллон нельзя вскрывать и сжигать. Не распылять вблизи открытого огня или на раскаленные предметы.

Использование в педиатрии

Ограничений по применению препарата у детей не существует.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C, вдали от источников воспламенения.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Pantenolsprey>