

Пантодерм



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Декспантенол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения 5%** от белого с желтоватым оттенком до светло-желтого цвета, со специфическим запахом.

	100 г
декспантенол	5 г

Вспомогательные вещества: вазелин, парафин жидкий, масло миндаля, воск пчелиный белый, ланолин, цетостеариловый спирт (цетиловый спирт 60%, стеариловый спирт 40%), ланолиновый спирт, вода очищенная.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат, улучшающий трофику и регенерацию тканей, для наружного применения. Оказывает регенерирующее, метаболическое и слабое противовоспалительное действие.

Декспантенол в организме образует активный метаболит - пантотеновую кислоту, являющуюся составной частью кофермента А, участвует в процессах ацетилирования, обмене углеводов и жиров, синтезе ацетилхолина,

Пантодерм

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

кортикостероидов, порфиринов. Стимулирует регенерацию кожи, слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон.

Фармакокинетика

При местном применении быстро абсорбируется и превращается в пантотеновую кислоту. Связывается с белками плазмы (главным образом с бета-глобулином и альбумином).

Концентрация пантотеновой кислоты в крови - 0.5-1 мг/л, в сыворотке - 100 мкг/л.

В организме пантотеновая кислота не подвергается метаболизму (кроме включения в КоА), выводится в неизменном виде.

Показания к применению:

- сухость кожи;
- мелкие повреждения кожи, ссадины, трещины, ожоги (в т.ч. солнечные);
- буллезный дерматит;
- абсцессы, фурункулы;
- трофические язвы голени, пролежни;
- асептические послеоперационные раны, плохо приживающиеся кожные трансплантаты;
- лечение и профилактика трещин и воспаления сосков молочной железы в период лактации;
- лечение профилактика опрелостей у грудных детей.

Относится к болезням:

- [Абсцесс](#)
- [Воспаление](#)
- [Дерматит](#)
- [Ожоги](#)
- [Пролежни](#)
- [Раны](#)
- [Ссадины](#)
- [Фурункул](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют наружно.

Мазь наносят на поврежденный или воспаленный участок кожи один или несколько раз в сутки.

При уходе за *молочными железами* у кормящих матерей мазь наносят на соски после каждого кормления; можно использовать в виде компресса.

При уходе за *грудными детьми* мазь наносят при каждой смене подгузника (пеленки).

Побочное действие:

Возможно: возникновение аллергических реакций.

Передозировка:

Пантодерм

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Случаи передозировки не отмечены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Пантодерм можно применять при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данных о взаимодействии препарата Пантодерм с другими лекарственными препаратами нет.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Возможно применение по показаниям.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Pantoderm>