Пантодерм Плюс

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Мазь для наружного применения 5%*** белого или почти белого цвета.

	100 г
декспантенол	5 г
хлоргексидина биглюконат	0.076 г

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 9 г, скваалн - 3 мг, парафин жидкий - 14 г, парафин мягкий белый - 5 г, диметикон - 1 г, цетостеариловый спирт (цетиловый спирт - 60%, стеариловый спирт - 40%) - 6.7 мг, макрогола цетостеарат - 2.3 г, пантолактон - 0.5 г, вода очищенная - до 100 г.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированное лекарственное средство для наружного применения. Оказывает противомикробное, противовоспалительное действие: улучшает регенерацию тканей.

Декспантенол в клетках кожи быстро превращается в пантотеновую кислоту, которая играет важную роль как в формировании, так и в заживлении поврежденных кожных покровов.

Хлоргексидин - антисептик, активен в отношении вегетативных форм грамотрицательных и грамположительных бактерий, а также дрожжей, дерматофитов и липофильных вирусов. На споры бактерий действует только при повышенной температуре. Очищает и дезинфицирует кожу, не вызывая ее повреждения.При нанесении на поверхность раны защищает от инфекции, способствуя заживлению.

Показания к применению:

Небольшие раны с угрозой инфицирования (ссадины, царапины, небольшие порезы и расчесы, трещины, легкие ожоги); инфицированные поверхностные поражения кожи; трещины сосков в период грудного вскармливания; хронические раны (например, трофические язвы голени, пролежни); операционные раны.

Относится к болезням:

- Ожоги
- Поражения кожи
- Порезы
- Пролежни
- Раны
- Ссадины
- Трофические язвы
- Царапины

Противопоказания:

Для обработки или лечения ушной раковины; в случае тяжелых, глубоких и сильно загрязненных ран (такие повреждения требуют врачебного вмешательства); повышенная чувствительность к декспантенолу и/или хлоргексидину.

Способ применения и дозы:

Применяют наружно 1 или несколько раз/сут, наносят на предварительно очищенную раневую поверхность или на воспаленные участки кожи. Лечение ран может проводиться как открытым способом, так и с использованием повязок.

Побочное действие:

Аллергические реакции: возможны крапивница, зуд.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Можно использовать при беременности и в период грудного вскармливания, однако следует избегать применения на больших поверхностях кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Диагнозы

- Боли в мышцах
- Диарея путешественников
- Инородные тела
- Кровотечения

Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания в глаза препаратов, содержащих декспантенол/хлоргексидин.

Нельзя принимать внутрь.

Большие по площади поражения, сильно загрязненные и глубокие раны, а также укушенные и колотые раны требуют врачебного вмешательства (из-за риска развития столбняка).

Если размеры раны в течение некоторого времени остаются неизменно большими или рана не заживает в течение 10-14 дней, то необходима консультация врача. Это необходимо и в случае, если края раны сильно гиперемированы, рана неожиданно отекает, появляются сильные боли или повреждение сопровождается лихорадкой (из-за опасности развития сепсиса).

Источник: http://drugs.thead.ru/Pantoderm_Plyus