

## Пантогам актив



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [D,L-Гопантенвая кислота](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

**Капсулы** твердые желатиновые, размер №1, желтого цвета; содержимое капсул - порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

	<b>1 капс.</b>
D,L-гопантенвая кислота	200 мг

*Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая - 13.98 мг, магния стеарат - 1.02 мг.

*Состав оболочки капсулы:* желатин, глицерол (глицерин), нипагин (метилпарагидроксибензоат), нипазол (пропилпарагидроксибензоат), натрия лаурилсульфат, вода очищенная, титана диоксид, железа оксид желтый.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.  
15 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.  
60 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

**Капсулы** твердые желатиновые, размер №0, белого цвета; содержимое капсул - порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

	<b>1 капс.</b>
D,L-гопантенвая кислота	300 мг

*Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая - 20.97 мг, магния стеарат - 1.53 мг.

*Состав оболочки капсулы:* желатин, глицерол (глицерин), нипагин (метилпарагидроксибензоат), нипазол (пропилпарагидроксибензоат), натрия лаурилсульфат, вода очищенная, титана диоксид.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.  
15 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.  
15 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.  
30 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.  
50 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Действие Пантогам актив связано с наличием в его структуре гамма-аминомасляной кислоты, которая

## Пантогам актив

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

непосредственно воздействует на ГАМК<sub>B</sub>-рецептор-канальный комплекс. Пантогам актив представляет собой рацемическую смесь равных количеств R-формы гопантеновой кислоты и ее S-изомера. Присутствие изомера улучшает транспорт и взаимодействие препарата с рецептором ГАМК. Пантогам актив обладает более выраженным ноотропным и противосудорожным действием, чем препараты гопантеновой кислоты первого поколения.

Пантогам актив повышает устойчивость мозга к гипоксии и воздействию токсических веществ, стимулирует анаболические процессы в нейронах, сочетает умеренное седативное действие с мягким стимулирующим эффектом. Обладает антиастеническим и легким противотревожным действием. Уменьшает моторную возбудимость, упорядочивает поведение. Активирует умственную деятельность и работоспособность. Вызывает торможение патологически повышенного пузырного рефлекса и тонуса детрузора.

### Фармакокинетика

Быстро всасывается из ЖКТ. Проникает через гематоэнцефалический барьер. Не метаболизируется и выводится в неизменном виде в течение 48 ч: около 70% от принятой дозы - с мочой, около 30% - с калом.

## Показания к применению:

- когнитивные нарушения при органических поражениях головного мозга (в т.ч. последствия нейроинфекций и черепно-мозговых травм) и невротических расстройствах;
- цереброваскулярная недостаточность, вызванная атеросклеротическими изменениями сосудов головного мозга;
- экстрапирамидные гиперкинезы (миоклонус-эпилепсия, хорея Гентингтона, гепатолентикулярная дегенерация, болезнь Паркинсона и другие), а также для лечения экстрапирамидного синдрома, вызванного приемом нейролептиков;
- при эпилепсии совместно с противосудорожными средствами;
- психоэмоциональные перегрузки, снижение умственной и физической работоспособности, для улучшения концентрации внимания и запоминания;
- нейрогенные расстройства мочеиспускания (поллакиурия, императивные позывы, императивное недержание мочи, энурез);
- при шизофрении в комплексной терапии.

## Относится к болезням:

- [Атеросклероз](#)
- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Травмы](#)
- [Хорея](#)
- [Цереброваскулярная недостаточность](#)
- [Черепно-мозговая травма](#)
- [Шизофрения](#)
- [Энурез](#)
- [Эпилепсия](#)

## Противопоказания:

- острые тяжелые заболевания почек;
- беременность (I триместр);
- лактация;
- возраст пациента до 18 лет (нет клинических исследований по использованию препарата в этом возрасте);
- повышенная чувствительность.

## Способ применения и дозы:

## **Пантогам актив**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Внутри, через 15-20 мин после еды, 2-3 раза/сут предпочтительно в утренние и дневные часы.

Капсулы 200 мг - по 1-4 капсулы (0.2-0.8 г). Максимальная суточная доза - 12 капсул (2.4 г).

Капсулы 300 мг - по 1-3 капсулы (0.3-0.9 г). Максимальная суточная доза 8 капсул (2.4 г). Курс лечения - 1-4 месяца, иногда до 6-12 месяцев. Через 3-6 месяцев возможно проведение повторного курса лечения.

### **Побочное действие:**

В редких случаях возможны аллергические реакции (ринит, конъюнктивит, кожные высыпания). В этом случае уменьшают дозу или отменяют препарат. Нарушения сна или сонливость, шум в голове - данные симптомы обычно кратковременны и не требуют отмены препарата.

### **Передозировка:**

Усиление симптоматики побочных явлений.

*Лечение:* активированный уголь, промывание желудка, симптоматическая терапия.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат противопоказан при беременности (I триместр) и в период лактации.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Пролонгирует действие барбитуратов, усиливает эффекты противосудорожных средств, предотвращает побочные явления фенобарбитала, карбамазепина, нейролептиков.

Эффект Пантогама актив усиливается при сочетании с глицином, этидроновой кислотой.

Потенцирует действие местных анестетиков (прокаина).

### **Особые указания и меры предосторожности:**

В условиях длительного лечения не рекомендуется одновременное назначение препарата с другими ноотропными и стимулирующими ЦНС средствами.

#### ***При нарушениях функции почек***

Противопоказан при острых тяжелых заболеваниях почек.

#### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан детям до 18 лет, т.к. нет клинических исследований по использованию препарата в этом возрасте.

### **Условия хранения:**

Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Pantogam\\_aktiv](http://drugs.thead.ru/Pantogam_aktiv)