

[Пантокрин "пантея" \(экстракт\)](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Адаптогенное средство. Оказывает стимулирующее действие на ЦНС и сердечно-сосудистую систему, повышает тонус скелетных мышц, двигательную активность кишечника. Содержит фосфолипиды и микроэлементы, повышает работоспособность и нормализует АД при артериальной гипотензии, стимулирует деятельность органов ЖКТ.

Показания к применению:

Астения.

В составе комплексной терапии - неврастения, артериальная гипотензия.

Относится к болезням:

- [Астения](#)
- [Гипотензия](#)
- [Неврит](#)

Противопоказания:

Выраженный атеросклероз, хроническая сердечная недостаточность, стенокардия, гиперкоагуляция, нефрит (тяжелые формы), диарея, артериальная гипертензия, злокачественные новообразования.

Способ применения и дозы:

Внутрь, за 30 мин до еды, 2-3 раза/сут в течение 2-3 нед. Интервал между курсами - 10 дней. При необходимости через 5-7 дней курс лечения можно повторить (обычно до 3 раз в год).

Вводят п/к и в/м - по 1-2 мл/сут; курс лечения - 15-20 дней, проводят 2-3 курса с перерывом в 10 дней.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции (кожный зуд), повышение АД, головная боль.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не следует назначать с антикоагулянтами, солями кальция и средствами, стимулирующими перистальтику кишечника.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказан при нефрите (тяжелых формах).

Источник: http://drugs.thead.ru/Pantokrin_panteya_ekstrakt