

## Пантовигар



### Код АТХ:

- [A11JC](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

♦ **Капсулы** твердые желатиновые, с корпусом белого с кремоватым оттенком цвета и крышечкой темно-зеленого цвета; диаметр капсул 6.7-6.9 мм, длина 19.1-19.7 мм; содержимое капсул - светло-коричневый порошок с характерным запахом.

|                                           | <b>1 капс.</b> |
|-------------------------------------------|----------------|
| тиамина мононитрат (вит. В <sub>1</sub> ) | 60 мг          |
| кальция пантотенат (вит. В <sub>5</sub> ) | 60 мг          |
| цистин                                    | 20 мг          |
| пара-аминобензойная кислота               | 20 мг          |
| кератин                                   | 20 мг          |
| дрожжи медицинские                        | 100 мг         |

*Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, тальк, магния стеарат, повидон, кремния диоксид коллоидный.

*Состав оболочки капсулы:* желатин, вода очищенная, титана диоксид, краситель железа оксид желтый, индигокармин.

15 шт. - блистеры (2) - коробки картонные.

15 шт. - блистеры (6) - коробки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Комбинированный препарат, содержащий необходимые для роста волос и ногтей компоненты - кальция пантотенат, цистин, аминокислоты, кератин. Действие препарата обусловлены свойствами входящих в его состав компонентов.

### Фармакокинетика

Действие препарата Пантовигар является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным.

## Показания к применению:

- диффузное выпадение волос негормональной этиологии;
- дегенеративные изменения структуры волос (вследствие химического воздействия, повреждения волос солнечным и ультрафиолетовым излучением);
- нарушение структуры ногтей.

## Противопоказания:

- I и II триместр беременности;
- период лактации (грудного вскармливания);
- детский возраст;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым** препарат назначают по 1 капсуле 3 раза/сут. Препарат рекомендуется принимать одновременно с приемом пищи, капсулу следует проглатывать целиком, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости.

Длительность курса лечения составляет 3-6 мес. При необходимости возможно увеличение продолжительности курса лечения или его повторение.

## Побочное действие:

*Аллергические реакции:* кожный зуд, крапивница.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* учащение пульса.

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, рвота, метеоризм, боли в области живота.

*Прочие:* повышенное потоотделение.

## Передозировка:

О случаях передозировки препарата Пантовигар не сообщалось.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению в I и II триместрах беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

В III триместре беременности применение препарата возможно только по назначению врача.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие препарата не описано.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Инфекционные заболевания ногтей и андрогенное облысение не являются показаниями к применению препарата. При данных патологиях препарат может быть использован в составе комбинированной терапии.

Следует объяснить пациенту, что формирование волос является длительным процессом, и поэтому препарат необходимо принимать в указанных дозах регулярно в течение 3-6 мес.

Пациент должен быть осведомлен, что если заболевания волос или ногтей принимают неблагоприятное, сильно прогрессирующее течение, необходимо снова обратиться к врачу, т.к. эти заболевания могут быть симптомами системных заболеваний.

Если пациент принимает сульфаниламидные препараты, перед началом приема Пантовигара ему следует проконсультироваться с врачом.

### ***Применение в детском возрасте***

Препарат противопоказан детям.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Pantovigar>