

## [Папазол](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Бендазол](#)
- [Папаверин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат, оказывает спазмолитическое, гипотензивное, вазодилатирующее действие.

Бендазол - спазмолитическое средство миотропного действия; оказывает гипотензивное, вазодилатирующее действие, стимулирует функцию спинного мозга, обладает умеренной иммуностимулирующей активностью.

Папаверин - спазмолитическое средство, оказывает гипотензивное действие. Ингибирует фосфодиэстеразу, вызывает накопление в клетке цАМФ и снижение содержания кальция, снижает тонус и расслабляет гладкие мышцы внутренних органов (ЖКТ, дыхательной и мочеполовой системы) и сосудов. В больших дозах снижает возбудимость сердечной мышцы и замедляет внутрисердечную проводимость. Действие на ЦНС выражено слабо (в больших дозах оказывает седативный эффект).

### **Показания к применению:**

- артериальная гипертензия (лабильная);
- спазм периферических артерий и сосудов головного мозга;
- спазм гладкой мускулатуры внутренних органов (в т.ч. язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, спазм привратника, кишечная колика, холецистит, спастический колит);
- полиомиелит (остаточные явления);

— периферический паралич лицевого нерва.

## Относится к болезням:

- [Гипертензия](#)
- [Кишечная колика](#)
- [Кишечные колики](#)
- [Колит](#)
- [Паралич](#)
- [Спазмы](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

## Противопоказания:

- нарушения AV-проводимости;
- эпилептический синдром;
- бронхообструктивный синдром;
- детский возраст до 1 года;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* назначают при сниженной перистальтике кишечника, черепно-мозговой травме, печеночной и/или почечной недостаточности, гипотиреозе, надпочечниковой недостаточности, гиперплазии предстательной железы, при беременности и в период лактации.

## Способ применения и дозы:

Внутрь **взрослым** - по 1-2 таб. 2-3 раза/сут.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, запор.

*Со стороны ЦНС:* головокружение.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* AV-блокада, аритмии, снижение сократимости миокарда.

*Прочие:* аллергические реакции, повышенное потоотделение.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

С *осторожностью* назначают при беременности и в период лактации.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении препарата со спазмолитиками, седативными лекарственными средствами, диуретиками, трициклическими антидепрессантами, прокаиномидом, резерпином, хинидином возможно усиление выраженности гипотензивного эффекта.

Папазол ослабляет действие антихолинэстеразных лекарственных средств на гладкую мускулатуру (галантамин, прозерин, физиостигмин).

Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие лекарственные средства уменьшают всасывание препарата в ЖКТ.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Безопасность применения препарата при беременности и в период лактации не установлена.

### ***При нарушениях функции почек***

Противопоказан при почечной недостаточности.

### ***При нарушениях функции печени***

Противопоказан при печеночной недостаточности.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан в детском возрасте до 1 года.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Papazol>