Пара плюс



Код АТХ:

- P03AC04

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Аэрозоль для наружного применения*** в виде прозрачного маслянистого раствора с желтоватым оттенком, с легким характерным запахом; распыляется в виде мелких частиц.

	100 г раствора	**1 баллон**
малатион	500 мг	290 мг
перметрин	1 г	580 мг
пиперонила бутоксид	4 г	2.32 г

Вспомогательные вещества: изододекан - 54.81 г, пропеллент HFA 134a - 58 г.

116 г - баллоны аэрозольные алюминиевые с клапаном непрерывного действия и распылительным устройством (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для лечения педикулеза волосистой части головы.

Фармакологическое действие препарата обусловлено наличием активных веществ, обладающих инсектицидным действием. Перметрин – нейротоксичный яд для насекомых. Пиперонилбутоксид усиливает действие перметрина. Малатион - органофосфорный инсектицид.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Пара плюс не предоставлены.

Показания к применению:

— лечение педикулеза волосистой части головы (воздействие на вшей и гнид).

Противопоказания:

— бронхиальная астма;

— детский возраст до 2.5 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Кратковременными нажатиями препарат распыляют на кожу головы и на всю длину волос. Экспозиция препарата составляет 10 мин, при этом голову не покрывают. Затем голову необходимо вымыть шампунем. Мертвых насекомых вычесывают частой расческой.

В случае обширного заражения рекомендуется повторить обработку через неделю.

Побочное действие:

Местные реакции: очень редко - ощущение легкого пощипывания или жжения кожи головы.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Пара плюс не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Адекватных и строго контролируемых исследований безопасности применения Пара плюс при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не проводилось.

Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода или ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Пара плюс не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат следует распылять в хорошо проветриваемом помещении. Во время распыления и экспозиции препарата следует находиться вдали от огня.

Избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки. При случайном попадании в глаза тщательно промыть их теплой водой.

Во избежание повторного заражения следует обработать все текстильные изделия, с которыми контактировал пациент (в т.ч. подушки, головные уборы, воротники одежды).

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Нет данных об отрицательном влиянии применения препарата на способность управлять автомобилем и другими транспортными средствами.

Применение в детском возрасте

Противопоказано применение у детей в возрасте до 2.5 лет.

Применение у детей старше 2.5 лет возможно согласно режиму дозирования.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Para_plyus