# Парацетамол-Акос

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Сироп 2.4%*** в виде прозрачной, густой жидкости желтого цвета, сладкого вкуса с горьковатым привкусом и фруктовым запахом.

| | **5 мл (1 чайн.л.)** |
|---|---|
| парацетамол | 120 мг |

*Вспомогательные вещества:* сахар, сорбитол, лимонная кислота, натрия цитрат трехзамещенный, пропиленгликоль, этанол, рибофлавин, ароматические добавки, натрия бензоат, вода.

50 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Анальгетик-антипиретик. Обладает выраженным жаропонижающим, анальгезирующим, а также слабым противовоспалительным действием.

Механизм действия связан с ингибированием синтеза простагландинов, преимущественным влиянием на центр терморегуляции в гипоталамусе.

***Фармакокинетика***

Данные по фармакокинетике препарата Парацетамол-АКОС не предоставлены.

## Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания, сопровождающиеся повышением температуры тела у детей в возрасте 3 месяцев и старше, в т.ч.:

— ОРЗ;

— грипп;

— детские инфекции;

— постпрививочные реакции.

Болевой синдром слабой и умеренной интенсивности, в т.ч.:

— головная боль;

— зубная боль;

— невралгия;

— миалгия;

— боли при травмах и ожогах.

## Относится к болезням:

- Грипп
- Зубная боль
- Инфекции
- Миалгия
- Невралгия
- Неврит
- Травмы

## Противопоказания:

— тяжелые нарушения функции печени;

— тяжелые нарушения функции почек;

— заболевания крови;

— дефицит фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;

— сахарный диабет;

— повышенная чувствительность к парацетамолу и другим компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь до еды 3-4 раза/сут с интервалом 4-6 ч.

Детям раннего возраста препарат можно добавлять в бутылочку с водой, чаем.

В 5 мл сиропа (1 чайная ложка) содержится 120 мг парацетамола.

Доза для **детей** зависит от возраста и массы тела.

Разовая доза составляет 10-15 мг/кг массы тела ребенка. Максимальная суточная доза - 60 мг/кг массы тела.

В зависимости от возраста препарат в форме сиропа назначают в следующих разовых дозах:

| | |
|---|---|
| Дети в возрасте от 3 месяцев до 1 года | 2.5-5 мл (1/2-1 чайная ложка) или 60-120 мг |
| Дети от 1 года до 6 лет | 5-10 мл (1-2 чайные ложки) или 120-240 мг |
| Дети от 6 до 14 лет | 10-20 мл (2-4 чайные ложки) или 240-480 мг |

Длительность лечения составляет не более 3 дней в качестве жаропонижающего средства и не более 5 дней - в качестве обезболивающего. Необходимость продолжения лечения препаратом решает врач.

Перед употреблением препарат тщательно взбалтывают.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* возможны тошнота, боли в животе; редко при длительном применении - нарушения функции печени.

*Аллергические реакции:* возможны кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек.

*Со стороны мочевыделительной системы:* редко при длительном применении - нарушения функции почек.

*Со стороны системы кроветворения:* редко при длительном применении - анемия, агранулоцитоз, тромбоцитопения.

## Передозировка:

*Симптомы:* бледность кожных покровов, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, боли в животе, повышение активности печеночных ферментов, увеличение протромбинового времени, позднее появляется болезненность в области печени. В тяжелых случаях развивается печеночная недостаточность, коматозное состояние и энцефалопатия.

*Лечение:* промывание желудка в течение первых часов после приема препарата в чрезмерной дозе, прием энтеросорбентов, в/в введение антидота N-ацетилцистеина, назначение внутрь метионина.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном приеме с салицилатами значительно повышается риск нефротоксического действия.

При одновременном приеме барбитуратов, трициклических антидепрессантов, рифампицина, бутадиона, а также этанола повышается риск гепатотоксического действия препарата.

Парацетамол усиливает действие антикоагулянтов.

## Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью применять Парацетамол-АКОС у пацентов с заболеваниями печени, почек, при синдроме Жильбера. При появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата, в таких случаях требуется контроль врача.
*Контроль лабораторных показателей*
При применении препарата через 7 дней необходимо контролировать функциональное состояние печени и картину периферической крови.
*Использование в педиатрии*
Не рекомендуется назначать препарат **детям в возрасте до 1 месяца**. Необходимость назначения препарата **детям младше 3 месяцев** врач определяет индивидуально.

***При нарушениях функции почек***

Противопоказан при тяжелых нарушениях функции почек.

***При нарушениях функции печени***

Противопоказан при тяжелых нарушениях функции печени.

***Применение в детском возрасте***

Детям раннего возраста препарат можно добавлять в бутылочку с водой, чаем.

В 5 мл сиропа (1 чайная ложка) содержится 120 мг парацетамола.

Доза для **детей** зависит от возраста и массы тела.

Разовая доза составляет 10-15 мг/кг массы тела ребенка. Максимальная суточная доза - 60 мг/кг массы тела.

В зависимости от возраста препарат в форме сиропа назначают в следующих разовых дозах:

| | |
|---|---|
| Дети в возрасте от 3 месяцев до 1 года | 2.5-5 мл (1/2-1 чайная ложка) или 60-120 мг |
| Дети от 1 года до 6 лет | 5-10 мл (1-2 чайные ложки) или 120-240 мг |
| Дети от 6 до 14 лет | 10-20 мл (2-4 чайные ложки) или 240-480 мг |

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не ниже 18°C; не замораживать.

При выпадении кристаллов нагреть флакон до 50-65°C до полного растворения. При нагревании качество препарата сохраняется.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Paracetamol-AKOS