

Парацетамол-Акос



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Сироп 2.4%** в виде прозрачной, густой жидкости желтого цвета, сладкого вкуса с горьковатым привкусом и фруктовым запахом.

	5 мл (1 чайн.л.)
парацетамол	120 мг

Вспомогательные вещества: сахар, сорбитол, лимонная кислота, натрия цитрат трехзамещенный, пропиленгликоль, этанол, рибофлавин, ароматические добавки, натрия бензоат, вода.

50 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Анальгетик-антипиретик. Обладает выраженным жаропонижающим, анальгезирующим, а также слабым противовоспалительным действием.

Механизм действия связан с ингибированием синтеза простагландинов, преимущественным влиянием на центр терморегуляции в гипоталамусе.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Парацетамол-АКОС не предоставлены.

Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания, сопровождающиеся повышением температуры тела у детей в возрасте 3 месяцев и старше, в т.ч.:

- ОРЗ;
- грипп;
- детские инфекции;
- постпрививочные реакции.

Болевой синдром слабой и умеренной интенсивности, в т.ч.:

- головная боль;
- зубная боль;
- невралгия;
- миалгия;
- боли при травмах и ожогах.

Относится к болезням:

- [Грипп](#)
- [Зубная боль](#)
- [Инфекции](#)
- [Миалгия](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)
- [Травмы](#)

Противопоказания:

- тяжелые нарушения функции печени;
- тяжелые нарушения функции почек;
- заболевания крови;
- дефицит фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
- сахарный диабет;
- повышенная чувствительность к парацетамолу и другим компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь до еды 3-4 раза/сут с интервалом 4-6 ч.

Детям раннего возраста препарат можно добавлять в бутылочку с водой, чаем.

В 5 мл сиропа (1 чайная ложка) содержится 120 мг парацетамола.

Доза для **детей** зависит от возраста и массы тела.

Разовая доза составляет 10-15 мг/кг массы тела ребенка. Максимальная суточная доза - 60 мг/кг массы тела.

В зависимости от возраста препарат в форме сиропа назначают в следующих разовых дозах:

Дети в возрасте от 3 месяцев до 1 года	2.5-5 мл (1/2-1 чайная ложка) или 60-120 мг
Дети от 1 года до 6 лет	5-10 мл (1-2 чайные ложки) или 120-240 мг
Дети от 6 до 14 лет	10-20 мл (2-4 чайные ложки) или 240-480 мг

Длительность лечения составляет не более 3 дней в качестве жаропонижающего средства и не более 5 дней - в качестве обезболивающего. Необходимость продолжения лечения препаратом решает врач.

Перед употреблением препарат тщательно взбалтывают.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: возможны тошнота, боли в животе; редко при длительном применении - нарушения функции печени.

Аллергические реакции: возможны кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек.

Со стороны мочевыделительной системы: редко при длительном применении - нарушения функции почек.

Со стороны системы кроветворения: редко при длительном применении - анемия, агранулоцитоз, тромбоцитопения.

Передозировка:

Симптомы: бледность кожных покровов, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, боли в животе, повышение активности печеночных ферментов, увеличение протромбинового времени, позднее появляется болезненность в области печени. В тяжелых случаях развивается печеночная недостаточность, коматозное состояние и энцефалопатия.

Лечение: промывание желудка в течение первых часов после приема препарата в чрезмерной дозе, прием энтеросорбентов, в/в введение антидота N-ацетилцистеина, назначение внутрь метионина.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном приеме с салицилатами значительно повышается риск нефротоксического действия.

При одновременном приеме барбитуратов, трициклических антидепрессантов, рифампицина, бутадiona, а также этанола повышается риск гепатотоксического действия препарата.

Парацетамол усиливает действие антикоагулянтов.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью применять Парацетамол-АКОС у пациентов с заболеваниями печени, почек, при синдроме Жильбера. При появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата, в таких случаях требуется контроль врача.

Контроль лабораторных показателей

При применении препарата через 7 дней необходимо контролировать функциональное состояние печени и картину периферической крови.

Использование в педиатрии

Не рекомендуется назначать препарат **детям в возрасте до 1 месяца**. Необходимость назначения препарата **детям младше 3 месяцев** врач определяет индивидуально.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при тяжелых нарушениях функции почек.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при тяжелых нарушениях функции печени.

Применение в детском возрасте

Детям раннего возраста препарат можно добавлять в бутылочку с водой, чаем.

В 5 мл сиропа (1 чайная ложка) содержится 120 мг парацетамола.

Доза для **детей** зависит от возраста и массы тела.

Разовая доза составляет 10-15 мг/кг массы тела ребенка. Максимальная суточная доза - 60 мг/кг массы тела.

В зависимости от возраста препарат в форме сиропа назначают в следующих разовых дозах:

Дети в возрасте от 3 месяцев до 1 года	2.5-5 мл (1/2-1 чайная ложка) или 60-120 мг
Дети от 1 года до 6 лет	5-10 мл (1-2 чайные ложки) или 120-240 мг
Дети от 6 до 14 лет	10-20 мл (2-4 чайные ложки) или 240-480 мг

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не ниже 18°C; не замораживать.

При выпадении кристаллов нагреть флакон до 50-65°C до полного растворения. При нагревании качество препарата сохраняется.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Paracetamol-AKOS>