

## [Пауэркорт](#)



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Клобетазол](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Крем для наружного применения 0.05%** белого цвета, однородный.

	<b>1 г</b>
клобетазола пропионат	500 мкг

*Вспомогательные вещества:* парафин белый мягкий, парафин жидкий, цетомакрогол, натрия фосфат моногидрат, натрия фосфат дигидрат, бутилгидрокситолуол, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, пропиленгликоль, вода очищенная.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

ГКС для наружного применения. Предупреждает краевое скопление нейтрофилов, уменьшает воспалительную экссудацию и продукцию лимфокинов, тормозит миграцию макрофагов, снижает интенсивность процессов инфильтрации и грануляции, оказывает местный противовоспалительный, противозудный, противоаллергический и антиэкссудативный эффекты.

#### **Фармакокинетика**

$C_{max}$  клобетазола пропионата достигается в плазме через 13 ч после первой аппликации и составляет 0.63 нг/мл. Системный метаболизм клобетазола пропионата после чрескожной абсорбции не изучался.

## Показания к применению:

- псориаз;
- экзема (различные формы);
- красный плоский лишай;
- дискоидная красная волчанка;
- заболевания кожи, устойчивые к терапии менее активными ГКС для местного применения.

## Относится к болезням:

- [Волчанка](#)
- [Лишай](#)
- [Псориаз](#)
- [Экзема](#)

## Противопоказания:

- розовые угри;
- вульгарные угри;
- рак кожи;
- узловая почесуха Гайда;
- периоральный дерматит;
- перианальный и генитальный зуд;
- бактериальные, вирусные и грибковые заболевания кожи (простой герпес, ветряная оспа, туберкулез кожи, актиномикоз);
- распространенный бляшечный и пустулезный псориаз;
- возраст до 1 года;
- период лактации;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Крем наносится тонким слоем на пораженную кожу 1-2 раза/сут до получения эффекта. Лечение нельзя проводить более 4 недель без оценки необходимости его продолжения. Для лечения обострений кожных заболеваний можно проводить повторные короткие курсы Пауэркортом. Если необходимо продолжение терапии ГКС, следует использовать менее активные препараты.

В особо резистентных случаях, особенно при наличии гиперкератоза, противовоспалительный эффект крема Пауэркорт может быть усилен с помощью наложения на ночь на область применения препарата повязки из полиэтиленовой пленки, что обычно сопровождается положительным эффектом. В дальнейшем достигнутый эффект удается поддерживать без применения окклюзионной повязки.

## Побочное действие:

Длительное назначение ГКС для местного применения в больших дозах или нанесение их на обширные участки кожи может сопровождаться системной абсорбцией с последующим развитием симптомов гиперкортицизма. Риск развития данного осложнения повышен у детей, особенно при применении окклюзионной повязки, при этом пеленка может выполнять роль такой повязки.

При условии назначения Пауэркорта взрослым пациентам в дозировке не более 50 г в неделю, подавление функции

гипофиза и надпочечников имеет транзиторный характер с быстрым их восстановлением сразу после окончания курса лечения.

Длительное лечение высокоактивными ГКС для местного применения в больших дозах может вызвать атрофические изменения кожи, в частности, ее истончение, появление атрофических полос (стрий), расширение поверхностных кровеносных сосудов, особенно при наложении окклюзионных повязок и при нанесении препарата на участки кожи со складками. Могут развиваться пигментация кожи и гипертрихоз. В редких случаях лечение псориаза ГКС для местного применения (или их отмена) провоцирует развитие пустулезного псориаза.

Иногда Пауэркорт может вызвать обострение симптомов заболевания.

## **Передозировка:**

Развитие острой передозировки маловероятно. Однако, в случае хронической передозировки или неправильного применения могут развиваться симптомы гиперкортицизма, что требует постепенной отмены препарата под наблюдением врача.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

ГКС для местного применения не следует применять при беременности длительное время в больших дозах.

Безопасность применения клобетазола пропионата в период лактации не установлена.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Нет данных.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Следует избегать назначения ГКС для местного применения в течение продолжительного времени, особенно при лечении детей младшего возраста, так как при этом может произойти подавление функции надпочечников. Применение Пауэркорта у детей требует наблюдения врача не реже 1 раза в неделю.

На лице чаще, чем на других участках тела, могут появиться атрофические изменения кожи в результате длительного применения местных ГКС.

При нанесении крема на веки необходимо следить за тем, чтобы препарат не попал в глаза, потому что это может вызвать глаукому.

Лечение псориаза ГКС для местного применения может сопровождаться развитием рецидивов заболевания, толерантности к препарату, генерализованной пустулезной формы заболевания, местных или системных токсических реакций из-за нарушения барьерной функции кожи, поэтому особенно важно внимательное наблюдение за пациентом.

При присоединении вторичной инфекции следует проводить соответствующую антибактериальную терапию. При любых признаках генерализации инфекции необходимо прекратить местное применение ГКС и провести соответствующее лечение антибактериальными препаратами.

Теплые влажные условия, создаваемые при наложении окклюзионной повязки, способствуют возникновению бактериальной инфекции, поэтому следует обязательно очищать кожу перед наложением новой повязки.

Крем не рекомендуется разводить.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Маловероятно, что клобетазола пропионат влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

### **Применение в детском возрасте**

Следует избегать назначения ГКС для местного применения в течение продолжительного времени, особенно при лечении детей младшего возраста, так как при этом может произойти подавление функции надпочечников. Применение Пауэркорта у детей требует наблюдения врача не реже 1 раза в неделю. Противопоказание: детский возраст до 1 года.

### **Условия хранения:**

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Pauerkort>