

Пайлекс



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки круглые, двояковыпуклые, от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, с вкраплениями более светлого и более темного цвета.

	1 г
порошок смолы коммифоры мукул камеде	130 мг
порошок листьев азадирахты индийской	7 мг
порошок мумие очищенного	16 мг
экстракт корней барбариса острого	32 мг
экстракт плодов эмблики лекарственной	16 мг
экстракт кожуры плодов терминалии чебула	16 мг
экстракт кожуры плодов терминалии белерика	16 мг
экстракт плодов кассии трубчатой	16 мг
экстракт коры баухинии варьегата пестрой	16 мг
экстракт месуа железной цветков	3 мг,
обработанный над паром экстракт смеси растительного сырья (в равных количествах в соотношении с водой 1:10): коммелины иволистной, мимозы стыдливой, смолы блюмеи малайской, семян цезальпинии бондуковой, клубнелуковиц аморфофаллуса колокольчатого.	

Вспомогательные вещества: магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, коповидон, кремния диоксид коллоидный, кармеллоза натрия.

100 шт. - флаконы пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Регенеранты и репаратанты](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Таблетки Пайлекс представляют собой многокомпонентное растительное средство, эффективность которого обусловлена комплексным действием его составляющих. Лекарственные растения, входящие в состав таблеток Пайлекс, оказывают противовоспалительное, противоотечное, веноотонизирующее, ранозаживляющее, мембраностабилизирующее, противомикробное и антиоксидантное действие. При применении таблеток Пайлекс наблюдается уменьшение венозного застоя, отечности, гиперемии и других признаков воспалительного процесса при остром и хроническом геморрое в стадии обострения. Препарат способствует улучшению микроциркуляции, ускорению процесса заживления, снижению вероятности инфицирования. Благодаря успокаивающему и легкому слабительному действию применение препарата Пайлекс облегчает процесс дефекации при хронических запорах, сопутствующих геморрою.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике многокомпонентного растительного препарата Пайлекс в лекарственной форме таблетки отсутствуют. Активность препарата обусловлена взаимно усиливающим сочетанным действием его компонентов, что характерно для растительных лекарственных средств. Поскольку активность препарата нельзя полностью отнести за счет какого-либо одного соединения, фармакокинетические исследования многокомпонентных растительных препаратов, в том числе Пайлекс таблетки, неосуществимы.

Показания к применению:

— геморрой 1-2 стадии.

Относится к болезням:

- [Геморрой](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата;
- эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта в стадии обострения;
- массивные кровотечения из геморроидальных узлов;
- острый тромбоз геморроидальных узлов;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности).

Способ применения и дозы:

Внутрь.

Взрослым по 2 таблетки 2 раза в день после еды.

Продолжительность курса терапии составляет 14 дней.

При необходимости курс терапии может быть продлен.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. Редко - диспепсические явления (тошнота, рвота, диарея), быстро проходящие после отмены препарата.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

До настоящего времени случаи передозировки не описаны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применять препарат во время беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Совместное применение препаратов Пайлекс таблетки и Пайлекс мазь способствует повышению эффективности лечения. Возможно применение с другими противогеморроидальными препаратами в курсе комплексной терапии.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не оказывает отрицательного влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и прочими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера/оператора и другое).

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом месте при температуре от 10 °С до 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Payleks>