

## Пайлекс Гем



### Код АТХ:

- [C05AX](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Мазь для наружного применения** от кремового до светло-серого цвета с запахом камфоры.

	<b>30 г</b>
экстракт жидкий водный из сбора*:	3.9 г
мимозы стыдливой целого растения	38%
эклипты белой целого растения	23%
прутняка китайского листьев	23%
календулы лекарственной цветков	16%
камфора рацемическая	0.368 г
натрия тетраборат	0.3 г
цинка оксид	0.3 г

*Вспомогательные вещества:* пропиленгликоль - 0.457 г, метилпарагидроксибензоат натрия - 0.006 г, пропил парагидроксибензоат натрия - 0.003 г, цетомacroгол 1000 - 0.090 г, цетостеариловый спирт (цетиловый спирт 60%, стеариловый спирт 40%) - 0.246 г, парафин жидкий 0.180 г, вазелин - 0.273 г, вода очищенная - 23.877 г.

\* - сбор предварительно обработан над паром экстракта из смеси растительного сырья: азадирахты индийской семян и листьев, айланта высокого коры, блюмеи смолоносной, эклипты белой целого растения, лука шалота листьев, аира обыкновенного корневищ, паслена черного целого растения, мимозы стыдливой целого растения.

30 г - тубы из ламинированной фольги (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Препарат обладает вяжущим, противовоспалительным, противоотечным, венотонизирующим, ангиопротекторным действием. Местное применение мази способствует уменьшению признаков венозного застоя, отечности, кровоточивости, улучшению микроциркуляции, исчезновению геморроидальных узлов. Препарат ускоряет процесс заживления, уменьшает раздражение кожи и слизистых. Благодаря анальгетическому и противовоспалительному действию облегчает процесс дефекации.

## Показания к применению:

- геморрой 1-2-ой стадии;
- проктит.

## Относится к болезням:

- [Проктит](#)

## Противопоказания:

- массивные кровотечения из геморроидальных узлов;
- острый тромбоз геморроидальных узлов;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Местно. **Взрослым:** 2 раза/сут (утром и вечером), а также до и после каждого акта дефекации. Продолжительность курса терапии составляет 14-28 дней. При необходимости курс терапии может быть продлен.

## Побочное действие:

*Возможны* аллергические реакции.

После нанесения мази возможно слабое жжение, пощипывание в области ануса продолжительностью 10-15 мин, не требующее дополнительной терапии и отмены препарата.

## Передозировка:

До настоящего времени случаи передозировки не описаны.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Совместное применение препаратов Пайлекс таблетки и Пайлекс гем мазь способствует повышению эффективности лечения. Возможно применение с другими противогеморроидальными препаратами в курсе комплексной терапии.

## Особые указания и меры предосторожности:

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям до 18 лет.

### **Условия хранения:**

Хранить препарат в сухом месте при температуре от 10° до 30°С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Payleks\\_Gem](http://drugs.thead.ru/Payleks_Gem)