

## [Пектолван Плющ](#)



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

#### **Форма выпуска, описание и состав**

<b>Сироп</b>	<b>1 мл</b>
экстракт листьев плюща сухой (4-8:1)	7 мг

Вспомогательные вещества: натрия цитрата дигидрат - 12 мг, лимонной кислоты моногидрат - 5.3 мг, сорбитол (E420) - 385 мг, калия сорбат - 1.34 мг, камедь ксантановая - 1.2 мг, ароматизатор вишневый пищевой "Вишня 667" - 0.125 мг, вода очищенная - до 1 мл.

100 мл - флаконы стеклянные (1) в компл. с дозир. ложкой - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Средство растительного происхождения. Оказывает противовоспалительное, ранозаживляющее, антиоксидантное действие. Сапонины проявляют антибактериальную и противогрибковую активность. Тритерпеноиды альфа-хедерин, хедеросапонины оказывают спазмолитическое, муколитическое и отхаркивающее действие. Флавоноиды (рутин, производные кемпферола) улучшают микроциркуляцию, проявляют гепато- и нефропротекторные свойства, повышают диурез, способствуют выведению солей мочевой кислоты.

### **Показания к применению:**

Острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания органов дыхания, сопровождающиеся упорным сухим кашлем; гепатохолециститы, пиелонефриты, нефролитиаз, подагра; дерматиты, гнойные раны, ожоги.

### **Относится к болезням:**

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Дерматит](#)
- [Инфекции](#)
- [Нефрит](#)
- [Нефролитиаз](#)
- [Ожоги](#)
- [Пиелит](#)

- [Пиелонефрит](#)
- [Подагра](#)
- [Раны](#)

## **Противопоказания:**

Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения функций щитовидной железы, повышенная чувствительность.

## **Способ применения и дозы:**

Применяют в виде приготовленного настоя листьев внутрь - по 15-50 мл 2-3 раза/сут; наружно или местно для полосканий, промываний, примочек. Курс лечения 2-6 недель.

## **Побочное действие:**

При применении по показаниям в рекомендуемых дозах не выявлены.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Не рекомендуется применять при беременности и в период лактации.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Растение ядовито. При передозировке возникают тошнота, рвота, диарея, головная боль, может повышаться АД. При контакте с сырьем возможен дерматит.

Не рекомендуется применять в детском возрасте.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Pektolvan\\_Plyushch](http://drugs.thead.ru/Pektolvan_Plyushch)