Пектолван Плющ



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Сироп	**1 мл**
экстракт листьев плюща сухой (4-8:1)	7 мг

Вспомогательные вещества: натрия цитрата дигидрат - 12 мг, лимонной кислоты моногидрат - 5.3 мг, сорбитол (Е420) - 385 мг, калия сорбат - 1.34 мг, камедь ксантановая - 1.2 мг, ароматизатор вишневый пищевой "Вишня 667" - 0.125 мг, вода очищенная - до 1 мл.

100 мл - флаконы стеклянные (1) в компл. с дозир. ложкой - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Оказывает противовоспалительное, ранозаживляющее, антиоксидантное действие. Сапонины проявляют антибактериальную и противогрибковую активность. Тритерпеноиды альфа-хедерин, хедеросапонины оказывают спазмолитическое, муколитическое и отхаркивающее действие. Флавоноиды (рутин, производные кемпферола) улучшают микроциркуляцию, проявляют гепато- и нефропротекторные свойства, повышают диурез, способствуют выведению солей мочевой кислоты.

Показания к применению:

Острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания органов дыхания, сопровождающиеся упорным сухим кашлем; гепатохолециститы, пиелонефриты, нефролитиаз, подагра; дерматиты, гнойные раны, ожоги.

Относится к болезням:

- Гепатит
- Гепатоз
- Дерматит
- Инфекции
- Нефрит
- Нефролитиаз
- Ожоги
- Пиелит

- Пиелонефрит
- Подагра
- Раны

Противопоказания:

Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения функций щитовидной железы, повышенная чувствительность.

Способ применения и дозы:

Применяют в виде приготовленного настоя листьев внутрь - по 15-50 мл 2-3 раза/сут; наружно или местно для полосканий, промываний, примочек. Курс лечения 2-6 недель.

Побочное действие:

При применении по показаниям в рекомендуемых дозах не выявлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применять при беременности и в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Растение ядовито. При передозировке возникают тошнота, рвота, диарея, головная боль, может повышаться АД. При контакте с сырьем возможен дерматит.

Не рекомендуется применять в детском возрасте.

Источник: http://drugs.thead.ru/Pektolvan_Plyushch