# Пелокс-400



## Код АТХ:

- J01MA03

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Пефлоксацин

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Таблетки, покрытые оболочкой*** белого или почти белого цвета, капсулообразные, с гравировкой "PELOX" с одной стороны и делительной риской - с другой.

| | **1 таб.** |
|---|---|
| пефлоксацина мезилат | 558 мг, |
| что соответствует содержанию пефлоксацина | 400 мг |

*Вспомогательные вещества:* крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая, натрия крахмала гликолат, магния стеарат, тальк очищенный, табкоат ТС 2034, полиэтиленгликоль, титана диоксид.

10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Противомикробный препарат широкого спектра действия из группы фторхинолонов. Действует бактерицидно. Препарат ингибирует фермент ДНК-гиразу бактерий, вследствие чего нарушаются репликация ДНК и синтез клеточных белков бактерий.

Препарат *активен в отношении грамположительных бактерий:* Streptococcus spp., Acinetobacter spp., Clostridium perfringens; *грамотрицательных бактерий:* Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Citrobacter spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Serratia marcescens, Neisseria gonorhoeae; *внутриклеточных микроорганизмов:* Chlamydia spp., Mycoplasma spp.

К препарату *устойчивы грамотрицательные анаэробные бактерии:* Bacteroides spp. (за исключением Bacteroides fragilis), Mycobacterium tuberculosis, Spirochaeta.

## Показания к применению:

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами:

— инфекции почек и мочевыводящих путей;

— инфекции верхних и нижних отделов дыхательных путей;

— инфекции ЛОР-органов;

— инфекции пищеварительной системы (в т.ч. рта, зубов, челюстей), желчного пузыря и желчевыводящих путей;

— инфекции кожи, слизистых оболочек и мягких тканей;

— инфекции опорно-двигательного аппарата;

— инфекции брюшной полости и органов малого таза;

— гонорея, хламидиоз, простатит;

— тяжелые системные инфекции: септицемия, бактериемия, эндокардит, менингоэнцефалит, остеомиелит;

— хирургические и внутрибольничные инфекции.

## Относится к болезням:

- Гонорея
- Инфекции
- Менингит
- Менингоэнцефалия
- Остеомиелит
- Простатит
- Эндокардит

## Противопоказания:

—эпилепсия;

—дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;

—беременность;

—лактация (грудное вскармливание);

—детский и подростковый возраст до 15 лет;

—повышенная чувствительность к пефлоксацину или другим препарата из группы фторхинолонов.

## Способ применения и дозы:

Режим дозирования устанавливают индивидуально, в зависимости от локализации и тяжести течения инфекции, а также чувствительности микроорганизмов.

Препарат назначают по 400 мг 2 раза/сут.

**Пациентам с нарушениями функции почек (при КК<20 мл/мин)** разовая доза составляет 50% от средней суточной дозы при кратности назначения 2 раза/сут или полную разовую вводят 1 раз/сут.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, рвота, диарея, абдоминальные боли, дисбактериоз.

*Со стороны ЦНС:* головная боль, головокружение, бессонница, тремор, судороги.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* тахикардия.

*Со стороны системы кроветворения:* тромбоцитопения, нейтропения.

*Со стороны костно-мышечной системы:* миалгия, артралгия, тендинит.

*Аллергические реакции:* гиперемия кожи, кожный зуд, крапивница.

*Прочие:* фотосенсибилизация, кандидоз.

## Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Пелокс-400 не сообщалось.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Одновременный прием пефлоксацина и теофиллина может привести к повышению концентрации теофиллина в плазме крови за счет конкурентного ингибирования в участках связывания цитохрома $P_{450}$ , что приводит к увеличению периода полувыведения теофиллина и возрастанию риска развития токсического действия последнего.

Одновременный прием антацидов, а также препаратов, содержащих ионы алюминия, цинка, железа и магния, может вызывать снижение всасывания пефлоксацина, поэтому интервал между назначением этих препаратов должен быть не менее 4 ч.

При одновременном применении пефлоксацина и антикоагулянтов удлиняется время кровотечения.

Пробенецид замедляет выведение пефлоксацина.

Блокаторы гистаминовых $H_2$ -рецепторов удлиняют период полувыведения, снижают общий и почечный клиренс пефлоксацина.

## Особые указания и меры предосторожности:

С *осторожностью* назначают препарат при атеросклерозе сосудов головного мозга, судорожном синдроме неустановленной этиологии.

В период лечения пациенты должны получать большое количество жидкости для предотвращения кристаллурии.

Вследствие возможной фотосенсибилизации в период лечения Пелоксом-400 следует избегать УФ-излучения (контакт с прямыми солнечными лучами).

При почечной и печеночной недостаточности необходима коррекция режима дозирования (уменьшение разовой дозы и кратности введения пропорционально степени повреждения функций).

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управление механизмами*

При применении препарата следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

***При нарушениях функции почек***

**Пациентам с нарушениями функции почек (при КК<20 мл/мин)** разовая доза составляет 50% от средней суточной дозы при кратности назначения 2 раза/сут или полную разовую вводят 1 раз/сут.

***При нарушениях функции печени***

При печеночной недостаточности необходима коррекция режима дозирования (уменьшение разовой дозы и кратности введения пропорционально степени повреждения функций).

***Применение в детском возрасте***

Препарат противопоказан детям и подросткам до 15 лет.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

*Условия отпуска из аптек*

Препарат отпускается по рецепту.

## Срок годности:

3 года.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Peloks-400