Пентабуфен



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Ибупрофен
- Кодеин
- Кофеин
- Метамизол натрия
- Фенобарбитал

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] [МНН] [МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] [МНН] [МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, свойства которого обусловлены компонентами, входящими в его состав.

Метамизол натрий - НПВС, производное пиразолона, по механизму действия практически не отличается от других НПВС (неселективно блокирует ЦОГ и снижает образование простогландина из арахидоновой кислоты). Отличительной чертой является незначительная выраженность противовоспалительного эффекта, слабое влияние на водно-солевой обмен (задержка натрия и воды) и слизистую оболочку ЖКТ. Оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и некоторое спазмолитическое (в отношении гладкой мускулатуры мочевыводящих и желчных путей) действие.

Ибупрофен - НПВС; оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие за счет неизбирательной блокады ЦОГ-1 и ЦОГ-2 и оказывает ингибирующее влияние на синтез простагландинов. Анальгезирующее действие наиболее выражено при болях воспалительного характера.

Кофеин - метилксантин, оказывающий психостимулирующий и аналептический эффект, повышает умственную и физическую работоспособность, стимулирует психическую деятельность, двигательную активность, укорачивает время ответных реакций, временно уменьшает утомление и сонливость.

Фенобарбитал - оказывает снотворное, спазмолитическое и миорелаксирующее действие. В малых дозах оказывает седативное действие.

Кодеин оказывает центральное противокашлевое действие (за счет подавления возбудимости кашлевого центра), а также обезболивающее действие, обусловленное возбуждением опиатных рецепторов в различных отделах ЦНС и периферических тканях, приводящим к стимуляции антиноцицептивной системы и изменению эмоционального восприятия боли.

Показания к применению:

Болевой синдром (слабой и средней интенсивности) различного генеза:

— артралгия;

— миалгия;

— радикулит;

— невралгия;

— головная боль;

— зубная боль;

— мигрень.

Простудные заболевания – в качестве симптоматической терапии (в т.ч. в качестве жаропонижающего лекарственного средства):

— ОРВИ;

— грипп.

Относится к болезням:

- Артралгия
- Артрит
- Артроз
- Головная боль
- Грипп
- Жар
- Зубная боль
- Миалгия
- Мигрень
- Невралгия
- Неврит
- Радикулит

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— печеночная и/или почечная недостаточность;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;

— хронический запор;

— бронхиальная астма;

— крапивница;

— ринит на фоне применения ацетилсалициловой кислоты и других НПВС;

— заболевания зрительного нерва;

— нарушение цветового зрения;

— амблиопия;

— скотома;

— угнетение кроветворения (агранулоцитоз, цитостатическая или инфекционная нейтропения);

— угнетение дыхания;

— внутричерепная гипертензия;

— черепно-мозговая травма;

— снижение слуха;

— патология вестибулярного аппарата;

— артериальная гипертензия;

— беременность;

— период лактации;

— детский возраст (до 12 лет).

С *осторожностью*: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии, гастрит, энтерит, колит, сопутствующие заболевания печени и/или почек, хроническая сердечная недостаточность, заболевания крови неясной этиологии, бронхиальная астма, крапивница, ринит, полипы слизистой оболочки носа, гипербилирубинемия, гипотиреоз, пожилой возраст.

Способ применения и дозы:

Внутрь, **взрослым** и **детям старше 12 лет** – по 1 таб. 1-3 раза/сут, запивая водой. Максимальная суточная доза – 4 таб.

Не принимать более 5 дней в качестве обезболивающего лекарственного средства и более 3-х дней - в качестве жаропонижающего без консультации врача. Если при приеме препарата в течение 2-3 дней симптомы заболевания сохраняются, лечение следует прекратить и обратиться к врачу.

Побочное действие:

Возникают при длительном (более 2-3 дней) применении.

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, изжога, анорексия, дискомфорт в эпигастрии, диарея, метеоризм, нарушение функции печени.

Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, снижение слуха, шум в ушах, бессонница, возбуждение, сонливость, депрессия.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердечная недостаточность, тахикардия.

Со стороны мочевыделительной системы: отечный синдром, нарушение функции почек.

Со стороны системы кроветворения: анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, лейкопения.

Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек.

Прочие: бронхоспазм, угнетение дыхания, потливость.

Передозировка:

Симптомы: боли в животе, тошнота, рвота, заторможенность, сонливость, сонливость, депрессия, головная боль, шум в ушах, сужение зрачка.

Лечение: промывание желудка, назначение активированного угля, щелочное питье, форсированный диурез, симптоматическая терапия, при угнетении дыхания – назначение специфического антагониста – налоксона.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

При длительном (более 5 дней) применении препарата необходим контроль картины периферической крови и функционального состояния печени.

Назначение препарата при остром абдоминальном болевом синдроме может затруднить установление диагноза.

Может изменить результаты анализов допинг-контроля спортсменов.

При необходимости определения 17-кетостероидов препарат следует отменить за 48 ч до исследования.

Во время лечения необходимо воздерживаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

Препарат противопоказан к применению при почечной недостаточности.

При нарушениях функции печени

Препарат противопоказан к применению при печеночной недостаточности.

Применение в пожилом возрасте

Применять с осторожностью у пациентов пожилого возраста.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан к применению у детей в возрасте до 12 лет.

Источник: http://drugs.thead.ru/Pentabufen