

- артралгия;
- миалгия;
- радикулит;
- невралгия;
- головная боль;
- зубная боль;
- мигрень.

Простудные заболевания – в качестве симптоматической терапии (в т.ч. в качестве жаропонижающего лекарственного средства):

- ОРВИ;
- грипп.

Относится к болезням:

- [Артралгия](#)
- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Головная боль](#)
- [Грипп](#)
- [Жар](#)
- [Зубная боль](#)
- [Миалгия](#)
- [Мигрень](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)
- [Радикулит](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- печеночная и/или почечная недостаточность;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;
- хронический запор;
- бронхиальная астма;
- крапивница;
- ринит на фоне применения ацетилсалициловой кислоты и других НПВС;
- заболевания зрительного нерва;
- нарушение цветового зрения;
- амблиопия;
- скотома;
- угнетение кроветворения (агранулоцитоз, цитостатическая или инфекционная нейтропения);
- угнетение дыхания;
- внутричерепная гипертензия;
- черепно-мозговая травма;
- снижение слуха;

Пентабуфен

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- патология вестибулярного аппарата;
- артериальная гипертензия;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст (до 12 лет).

С осторожностью: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии, гастрит, энтерит, колит, сопутствующие заболевания печени и/или почек, хроническая сердечная недостаточность, заболевания крови неясной этиологии, бронхиальная астма, крапивница, ринит, полипы слизистой оболочки носа, гипербилирубинемия, гипотиреоз, пожилой возраст.

Способ применения и дозы:

Внутрь, **взрослым и детям старше 12 лет** – по 1 таб. 1-3 раза/сут, запивая водой. Максимальная суточная доза – 4 таб.

Не принимать более 5 дней в качестве обезболивающего лекарственного средства и более 3-х дней - в качестве жаропонижающего без консультации врача. Если при приеме препарата в течение 2-3 дней симптомы заболевания сохраняются, лечение следует прекратить и обратиться к врачу.

Побочное действие:

Возникают при длительном (более 2-3 дней) применении.

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, изжога, анорексия, дискомфорт в эпигастрии, диарея, метеоризм, нарушение функции печени.

Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, снижение слуха, шум в ушах, бессонница, возбуждение, сонливость, депрессия.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердечная недостаточность, тахикардия.

Со стороны мочевыделительной системы: отечный синдром, нарушение функции почек.

Со стороны системы кроветворения: анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, лейкопения.

Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек.

Прочие: бронхоспазм, угнетение дыхания, потливость.

Передозировка:

Симптомы: боли в животе, тошнота, рвота, заторможенность, сонливость, сонливость, депрессия, головная боль, шум в ушах, сужение зрачка.

Лечение: промывание желудка, назначение активированного угля, щелочное питье, форсированный диурез, симптоматическая терапия, при угнетении дыхания – назначение специфического антагониста – налоксона.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

При длительном (более 5 дней) применении препарата необходим контроль картины периферической крови и функционального состояния печени.

Назначение препарата при остром абдоминальном болевом синдроме может затруднить установление диагноза.

Пентабуфен

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Может изменить результаты анализов допинг-контроля спортсменов.

При необходимости определения 17-кетостероидов препарат следует отменить за 48 ч до исследования.

Во время лечения необходимо воздерживаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

Препарат противопоказан к применению при почечной недостаточности.

При нарушениях функции печени

Препарат противопоказан к применению при печеночной недостаточности.

Применение в пожилом возрасте

Применять с осторожностью у пациентов пожилого возраста.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан к применению у детей в возрасте до 12 лет.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Pentabufen>