

## Пентафлуцин



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат, оказывающий жаропонижающее и противовоспалительное действие.

Парацетамол оказывает жаропонижающее и обезболивающее действие. Ненаркотический анальгетик, блокирует ЦОГ-1 и ЦОГ-2 преимущественно в ЦНС, воздействуя на центры боли и терморегуляции. В воспаленных тканях клеточные пероксидазы нейтрализуют влияние парацетамола на ЦОГ, что объясняет практически полное отсутствие противовоспалительного эффекта.

Аскорбиновая кислота играет важную роль в регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей, повышает сопротивляемость организма.

Дифенгидрамин оказывает антигистаминное и противовоспалительное, успокаивающее и снотворное действие.

Кальция глюконат является регулятором обмена кальция и фосфора.

Рутозид уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, обладает антиоксидантными свойствами.

### **Показания к применению:**

— гипертермия при простудных и других инфекционно-воспалительных заболеваниях.

### **Относится к болезням:**

- [Инфекции](#)

**Противопоказания:**

- гиперчувствительность;
- почечная и/или печеночная недостаточность;
- заболевания крови со склонностью к кровоизлияниям;
- дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
- беременность;
- период лактации.

С осторожностью: синдром Жильбера (конституциональная гипербилирубинемия), детский возраст (до 16 лет).

**Способ применения и дозы:**

Внутрь после еды по 1 пак. 3-4 раза в день в течение 3-5 суток. 1 пакет препарата растворить в 1/2 стакана горячей воды (допускается незначительный осадок в стакане). Применять свежеприготовленный раствор.

**Побочное действие:**

Кожные аллергические реакции, тошнота, рвота, головная боль, сонливость, общая слабость, головокружение.

Редко - тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз.

При длительном применении в высоких дозах возможно гепатотоксическое и нефротоксическое действие.

**Передозировка:**

Симптомы: тошнота, рвота, боли в желудке, через 1-2 сут - печеночная недостаточность, энцефалопатия, коматозное состояние.

Лечение: вызвать рвоту, промыть желудок, назначение адсорбентов (активированного угля), симптоматическая терапия (введение метионина, ацетилцистеина).

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказания: беременность; период лактации.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Следует избегать комбинации препарата с барбитуратами, противосудорожными средствами, дифенином, карбамазепином, рифампицином, зидовудином и другими индукторами микросомальных ферментов печени.

**Особые указания и меры предосторожности:**

Во избежание токсического поражения печени не следует сочетать прием препарата с употреблением этанола.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

В период лечения необходимо воздерживаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**При нарушениях функции почек**

Противопоказание — почечная недостаточность.

**При нарушениях функции печени**

Противопоказание — печеночная недостаточность.

**Применение в детском возрасте**

С осторожностью: детский возраст (до 16 лет).

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Pentaflucin>