

Пентовит



Код АТХ:

- [A11BA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые оболочкой	1 таб.
никотинамид	20 мг
пиридоксина гидрохлорид	5 мг
тиамина гидрохлорид	10 мг
фолиевая кислота	400 мкг
цианокобаламин	50 мкг

50 шт. - банки темного стекла (1) - пачки картонные.
100 шт. - банки темного стекла (1) - пачки картонные.
50 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
50 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Поливитаминовый препарат, действие обусловлено свойствами витаминов, входящих в его состав. Основанием для комбинации данных витаминов является их сочетанное действие на функциональное состояние центральной и периферической нервной системы.

Показания к применению:

Комплексная терапия заболеваний периферической (радикулиты, невралгии, невриты) и ЦНС, при астенических состояниях разного генеза.

Относится к болезням:

- [Астенические состояния](#)
- [Астения](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)
- [Радикулит](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- беременность;
- холелитиаз;
- хронический панкреатит;
- возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 2-4 таблетки 3 раза/сут (после еды). Курс лечения - 3-4 недели. Повторные курсы - по рекомендации врача.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение Пентовита в период беременности противопоказано. В период лактации препарат следует применять только после оценки соотношения риска для младенца и пользы для матери.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Витамин B₆, входящий в данный комплекс, снижает противопаркинсоническую активность леводопы. Алкоголь резко снижает всасывание витамина B₁.

Особые указания и меры предосторожности:

Не превышать рекомендованную суточную дозу.

Пентовит не оказывает влияния на способность управлять автомобилем и механизмами.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском и подростковом возрасте до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

Препарат следует использовать до даты, указанной на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Pentovit>