

Пепфиз



Код АТХ:

- [A09AA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Амилаза](#)
- [Папаин](#)
- [Симетикон](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает пищеварительное ферментное действие, ускоряет моторику ЖКТ, снижает газообразование в кишечнике.

Папаин и грибковая диастаза - пищеварительные ферменты, облегчают переваривание белков и углеводов, что способствует их более полной абсорбции в тонкой кишке. Папаин гидролизует пептиды и протеины, грибковая диастаза - углеводы (крахмал, гликоген и продукты их метаболизма).

Симетикон уменьшает поверхностное натяжение пузырьков газа, которые при этом распадаются. Высвобождающиеся газы поглощаются стенками кишечника и выводятся благодаря перистальтике кишечника.

Шипучая таблетка быстро растворяется в воде с высвобождением натрия цитрата и калия цитрата, которые нейтрализуют соляную кислоту в желудке, уменьшая проявления заболевания, связанные с повышенной кислотностью. Быстрое развитие антацидного действия защищает пищеварительные ферменты от действия желудочного сока.

Показания к применению:

- хронический панкреатит;
- заболевания печени;

- энтерит;
- синдром неязвенной диспепсии;
- метеоризм;
- усиленное образование газов в послеоперационном периоде;
- чувство переполнения желудка или метеоризм, обусловленный непривычной пищей, перееданием, злоупотреблением этанола, кофе, никотина;
- подготовка к рентгенологическому исследованию и УЗИ органов брюшной полости.

Относится к болезням:

- [Диспепсия](#)
- [Метеоризм](#)
- [Панкреатит](#)
- [Энтерит](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность.

С *осторожностью* препарат назначают при артериальной гипертензии, заболеваниях почек и печени.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 1 таб. 2 или 3 раза/сут после еды. Таблетку растворяют в 1/2 стакана воды (приблизительно 130 мл). Содержимое выпивают после растворения таблетки.

При подготовке к рентгенологическому исследованию и УЗИ органов брюшной полости по 1-2 таб. утром и вечером за 1-2 дня до исследования.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

Таблетка содержит около 419 мг Na⁺.

При нарушениях функции почек

С *осторожностью* препарат назначают при заболеваниях почек.

При нарушениях функции печени

С *осторожностью* препарат назначают при заболеваниях печени.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Pepfiz>