

## [Пепсан-Р](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Гвайазулен](#)
- [Диметикон](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

**Капсулы** синего цвета, мягкие, продолговатые, блестящие, вместимостью от 270 мкл до 333 мкл; содержимое капсул - вязкий раствор синего цвета.

	<b>1 капс.</b>
диметикон	300 мг
гвайазулен	4 мг

*Вспомогательные вещества:* желатин, глицерол, сорбитол 70% некристаллизуемый, патентованный синий V, титана диоксид, вода очищенная.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

**Гель для приема внутрь** голубого цвета, с мятным запахом.

	<b>1 саше</b>
диметикон	3 г
гвайазулен	4 мг

*Вспомогательные вещества:* сорбитол 70% кристаллизуемый, каррагенаты, натрия цикламат, метилпарагидроксibenзоат, масло мяты перечной, вода очищенная.

10 г - саше (12) - пачки картонные.

10 г - саше (14) - пачки картонные.

10 г - саше (30) - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

### Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Оказывает противовоспалительное действие, снижает секрецию соляной кислоты в желудке, уменьшает газообразование в кишечнике.

Гвайазулен обладает выраженным противовоспалительным эффектом, ослабляет аллергические реакции, усиливает регенеративные процессы, оказывает антиоксидантное действие. Благодаря ингибирующему эффекту на освобождение гистамина из мастоцитов, клеток слизистой оболочки желудка, тормозит кислотную секрецию.

Диметикон - гидрофобное полимерное вещество с низким поверхностным натяжением, снижающее газообразование в кишечнике и покрывающее защитной пленкой стенки пищеварительного канала.

### Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Пепсан-Р не предоставлены.

## Показания к применению:

- гастралгия;
- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 0-I степени;
- повышенная кислотность желудочного сока;
- функциональные расстройства ЖКТ, проявляющиеся изжогой, отрыжкой, повышенным газообразованием, тошнотой, запорами и/или диареей;
- подготовка к рентгенологическому, ультразвуковому или инструментальному исследованию органов брюшной полости.

## Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Диарея](#)
- [Запор](#)
- [Отрыжка](#)
- [Повышенная кислотность желудка](#)
- [Тошнота](#)

## Противопоказания:

- детский возраст до 14 лет (капсулы);
- детский и подростковый возраст до 18 лет (гель для приема внутрь);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Назначают по 1 капсуле или саше 2-3 раза/сут перед приемом пищи или при возникновении боли. Курс лечения определяется индивидуально.

При *подготовке к исследованиям органов брюшной полости* назначают по 1 капсуле или саше 2-3 раза в течение дня накануне исследования и 1 капсулу или саше утром в день исследования.

## Побочное действие:

*Редко:* аллергические реакции, боли, вздутие живота.

## Передозировка:

Возможно усиление побочных эффектов.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Возможно применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие не установлено.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Гель для приема внутрь не содержит сахара, поэтому не противопоказан пациентам с сахарным диабетом.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан в детском возрасте до 14 лет (капсулы), в детском и подростковом возрасте до 18 лет (гель для приема внутрь).

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности капсул - 4 года, геля для приема внутрь - 2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Pepsan-R>