Пепсан-Р



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Гвайазулен
- Диметикон

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн] Википедия[мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капсулы синего цвета, мягкие, продолговатые, блестящие, вместимостью от 270 мкл до 333 мкл; содержимое капсул - вязкий раствор синего цвета.

	1 капс.
диметикон	300 мг
гвайазулен	4 мг

Вспомогательные вещества: желатин, глицерол, сорбитол 70% некристаллизуемый, патентованный синий V, титана диоксид, вода очищенная.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Гель для приема внутрь голубого цвета, с мятным запахом.

	1 саше
диметикон	3 г
гвайазулен	4 мг

Вспомогательные вещества: сорбитол 70% кристаллизуемый, каррагенаты, натрия цикламат, метилпарагидроксибензоат, масло мяты перечной, вода очищенная.

10 г - саше (12) - пачки картонные.
10 г - саше (14) - пачки картонные.
10 г - саше (30) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Оказывает противовоспалительное действие, снижает секрецию соляной кислоты в желудке, уменьшает газообразование в кишечнике.

Гвайазулен обладает выраженным противовоспалительным эффектом, ослабляет аллергические реакции, усиливает регенеративные процессы, оказывает антиоксидантное действие. Благодаря ингибирующему эффекту на освобождение гистамина из мастоцитов, клеток слизистой оболочки желудка, тормозит кислотную секрецию.

Диметикон - гидрофобное полимерное вещество с низким поверхностным натяжением, снижающее газообразование в кишечнике и покрывающее защитной пленкой стенки пищеварительного канала.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Пепсан-Р не предоставлены.

Показания к применению:

— гастралгия;

— гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 0-I степени;

— повышенная кислотность желудочного сока;

— функциональные расстройства ЖКТ, проявляющиеся изжогой, отрыжкой, повышенным газообразованием, тошнотой, запорами и/или диареей;

— подготовка к рентгенологическому, ультразвуковому или инструментальному исследованию органов брюшной полости.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Диарея
- Запор
- Отрыжка
- Повышенная кислотность желудка
- Тошнота

Противопоказания:

— детский возраст до 14 лет (капсулы);

— детский и подростковый возраст до 18 лет (гель для приема внутрь);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Назначают по 1 капсуле или саше 2-3 раза/сут перед приемом пищи или при возникновении боли. Курс лечения определяется индивидуально.

При *подготовке к исследованиям органов брюшной полости* назначают по 1 капсуле или саше 2-3 раза в течение дня накануне исследования и 1 капсулу или саше утром в день исследования.

Побочное действие:

Редко: аллергические реакции, боли, вздутие живота.

Передозировка:

Возможно усиление побочных эффектов.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Гель для приема внутрь не содержит сахара, поэтому не противопоказан пациентам с сахарным диабетом.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 14 лет (капсулы), в детском и подростковом возрасте до 18 лет (гель для приема внутрь).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности капсул - 4 года, геля для приема внутрь - 2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Pepsan-R