

## [Перитол \(сироп\)](#)



### Код АТХ:

- [R06AX02](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Ципрогептадин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Сироп** светло-оранжевого цвета, прозрачный, с фруктовым запахом (тутти-фрутти) и сладким вкусом.

	<b>1 мл</b>
ципрогептадина гидрохлорида секвигидрат	430 мкг,
что соответствует содержанию ципрогептадина гидрохлорида	400 мкг

*Вспомогательные вещества:* этанол 96%, сорбиновая кислота, сахароза, натрия гидроксид, ледяная уксусная кислота, тутти-фрутти ароматическая добавка, ариавит сансет желтый (краситель солнечный закат желтый С.І.15895 Е.110), вода очищенная.

100 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с дозировочным колпачком - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Интермедианты](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Ципрогептадин является активным антагонистом гистамина, ацетилхолина и серотонина. Перитол предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций. Кроме противоаллергического оказывает противозудное, антиэкссудативное, антихолинергическое и седативное действие. Препарат стимулирует аппетит; блокирует гиперсекрецию соматотропина при акромегалии и секрецию АКТГ при синдроме Иценко-Кушинга.

#### Фармакокинетика

При применении внутрь быстро и хорошо абсорбируется из ЖКТ.  $C_{max}$  в крови достигается в течение первых 2 ч; терапевтический уровень концентрации сохраняется 4-6 ч. Хорошо распределяется в организме, включая ЦНС. Проникновение препарата через плацентарный барьер и его выделение с грудным молоком не подтверждено.

Ципрогептадин метаболизируется в печени. После однократного приема внутрь в дозе 4 мг 2-20% выводится через кишечник, не менее 40% введенной дозы препарата выводится с мочой, главным образом в форме конъюгатов с глюкуроновой кислотой. Элиминация препарата снижается при почечной недостаточности.

### Показания к применению:

- аллергические заболевания: крапивница, сенная лихорадка, сывороточная болезнь, ангионевротический отек Квинке;
- кожные заболевания: контактный дерматит и токсикодермии, нейродермит, экзема;
- головные боли сосудистого происхождения (мигрень, гистаминовая головная боль);
- вазомоторный ринит;
- аллергические реакции на прием лекарственных средств, переливание крови, введение рентгеноконтрастных веществ;
- анорексия различного происхождения.

### Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Ангина](#)
- [Ангионевротический отек](#)
- [Головная боль](#)
- [Дерматит](#)
- [Крапивница](#)
- [Лихорадка](#)
- [Мигрень](#)
- [Нейродермит](#)
- [Ринит](#)
- [Сенная лихорадка](#)
- [Сывороточная болезнь](#)
- [Токсикоз](#)
- [Экзема](#)

### Противопоказания:

- беременность;
- период лактации;
- закрытоугольная глаукома;
- доброкачественная гиперплазия предстательной железы, задержка мочеиспускания;
- предрасположенность к отекам;
- повышенная чувствительность к препарату;
- одновременное применение с ингибиторами MAO;
- детский возраст до 6 месяцев.

### Способ применения и дозы:

Принимая во внимание седативное действие, характерное для начала лечения, первую дозу Перитола рекомендуют принимать после ужина.

**Детям в возрасте от 6 до 24 месяцев** Перитол назначают в дозе 0.4 мг/кг массы тела в сутки.

**Для детей в возрасте от 2 до 6 лет** суточная доза составляет 6 мг/сут (3 раза по 5 мл сиропа), максимальная суточная доза 8 мг.

## Перитол (сироп)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Детям, страдающим анорексией**, назначают от 6-8 мг/сут.

**Детям в возрасте от 7 до 14 лет** Перитол назначают в дозе 12 мг/сут (3 раза/сут по 10 мл сиропа).

**Взрослым** обычная суточная доза Перитола для взрослых составляет 12 мг (3 раза/сут по 10 мл сиропа).

Максимальная суточная доза для взрослых может составлять 32 мг (80 мл сиропа).

Для лечения хронической крапивницы назначают 6 мг/сут (по 5 мл сиропа 3 раза/сут).

Для лечения анорексии Перитол назначают по 12 мг/сут (по 10 мл сиропа 3 раза/сут).

При *приступе острой мигрени* рекомендуется принимать 4 мг Перитола однократно (10 мл сиропа), при отсутствии эффекта повторяют прием этой же дозы через 30 мин, но в течение 4-6 ч доза препарата не должна превышать 8 мг (20 мл сиропа).

Для поддерживающей терапии обычно назначают по 4 мг (10 мл сиропа) 3 раза/сут.

Доза Перитола для лечения **больных с нарушениями функции печени** должна быть уменьшена.

За **пожилыми больными** во время лечения Перитолом рекомендуется проводить систематическое наблюдение.

## Побочное действие:

*Со стороны ЦНС:* сонливость, головокружение, головная боль, беспокойство, тремор, атаксия, зрительные галлюцинации.

*Со стороны ЖКТ:* сухость во рту, тошнота, рвота, диарея.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* гипотония, тахикардия.

*Со стороны системы кроветворения:* гемолитическая анемия, лейкопения, агранулоцитоз.

*Аллергические реакции:* отек Квинке, крапивница, экзантема, фоточувствительность.

## Передозировка:

Передозировка Перитола может сопровождаться как угнетением, так и возбуждением ЦНС, вплоть до развития судорог и летального исхода, особенно у младенцев и детей. Возможно развитие атропиноподобных эффектов и нарушение функции ЖКТ. *У детей:* мидриаз и неподвижность зрачков, гиперемия кожи лица, сосудистый коллапс, кома. *У взрослых:* заторможенность, депрессия, кома, психомоторное возбуждение, судороги; гипертермия, гиперемия кожи.

*Лечение:* промывание желудка, активированный уголь; при лечении если у больных, находящихся в сознании рвота не возникает спонтанно, ее вызывают препаратами ипекакуаны. Если рвоту вызвать не удастся, осуществляют промывание желудка изотоническим или полуизотоническим раствором натрия хлорида с последующим назначением активированного угля. Солевые слабительные оказывают быстрое действие, повышая осмотическое давление в кишечнике и задерживая всасывание препарата.

При угрожающих симптомах нарушения функции ЦНС и других органов необходимо проводить соответствующее лечение. Следует использовать стимуляторы ЦНС, а также вазопрессорные средства для устранения артериальной гипотензии.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан в период беременности и период лактации (грудного вскармливания).

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Комбинированное применение ципрогептадина с флуоксетином и другими ингибиторами обратного нейронального захвата серотонина приводит к снижению эффективности антидепрессантов.

Кофеин уменьшает угнетающее действие Перитола на ЦНС.

Аддитивное действие может наблюдаться при совместном применении Перитола с этанолом и другими веществами,

## Перитол (сироп)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

угнетающими ЦНС (седативные средства, снотворные препараты, анксиолитики).

Одновременное применение Перитола с другими лекарственными средствами, угнетающими ЦНС, требует постоянного наблюдения за больным и отмены препарата в случае необходимости.

Противопоказано одновременное применение Перитола с ингибиторами МАО. Ингибиторы МАО, а также трициклические антидепрессанты могут пролонгировать и усиливать м-холиноблокирующее действие ципрогептадина, и усиливать угнетающее влияние на ЦНС.

### Особые указания и меры предосторожности:

Лечение пожилых людей и детей требует особого внимания, т.к. эта группа больных более чувствительна к побочным эффектам антигистаминных препаратов.

Осторожность следует также соблюдать при лечении Перитолом больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также при наличии в анамнезе бронхиальной астмы, гипертиреоза или артериальной гипертензии.

Употребление спиртных напитков во время лечения Перитолом противопоказано.

*Влияние на способность вождения транспортных средств и управлению механизмами:*

Больным во время лечения Перитолом следует воздерживаться от вождения транспортных средств и управления техникой, а также выполнения работ, связанных с повышенным риском.

#### **При нарушениях функции печени**

Доза Перитола для лечения больных с нарушениями функции печени должна быть уменьшена.

#### **Применение в пожилом возрасте**

За пожилыми больными во время лечения Перитолом рекомендуется проводить систематическое наблюдение.

#### **Применение в детском возрасте**

**Детям до 6 мес.** препарат противопоказан.

**Детям в возрасте от 6 до 24 месяцев** Перитол назначают в дозе 0.4 мг/кг массы тела в сутки.

**Для детей в возрасте от 2 до 6 лет** суточная доза составляет 6 мг/сут (3 раза по 5 мл сиропа), максимальная суточная доза 8 мг.

**Детям, страдающим анорексией,** назначают от 6 мг до 8 мг Перитола в сутки.

**Детям в возрасте от 7 до 14 лет** Перитол назначают в дозе 12 мг/сут (3 раза/сут по 10 мл сиропа).

### Условия хранения:

Хранить препарат при температуре 15-25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

### Срок годности:

3 года.

### Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Peritol\\_sirop](http://drugs.thead.ru/Peritol_sirop)