

## Пертуссин



### **Код АТХ:**

- [R05CA10](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Калия бромид](#)
- [Тимьяна ползучего травы экстракт](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат растительного происхождения.

Трава чабреца оказывает отхаркивающее действие, увеличивает количество секреторного отделяемого слизистой оболочкой верхних дыхательных путей, способствует разжижению мокроты и ускорению ее выведения. Калия бромид снижает возбудимость ЦНС.

### **Показания к применению:**

В качестве отхаркивающего лекарственного средства: ОРЗ, трахеит, бронхит; коклюш.

### **Относится к болезням:**

- [Бронхит](#)
- [Коклюш](#)
- [Трахеит](#)

### **Противопоказания:**

- гиперчувствительность;
- декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность;
- беременность;

## **Пертуссин**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

— период лактации.

### **Способ применения и дозы:**

Внутрь. Взрослым - 1 ст. ложка, детям (в зависимости от возраста) - от 1/2 ч. ложки до 1 дес. ложки 3 раза в день.

### **Побочное действие:**

Аллергические реакции, изжога.

### **Передозировка:**

*Симптомы:* тошнота.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан при беременности и в период лактации.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Сироп содержит сахар, что необходимо учитывать пациентам с сопутствующим сахарным диабетом.

#### ***Применение в детском возрасте***

Детям (в зависимости от возраста) - от 1/2 ч.ложки до 1 дес.ложки 3 раза в день

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Pertussin>