Пертуссин-Ч



Код АТХ:

R05CA

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Калия бромид
- Тимьяна ползучего травы экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия MHH МНН Википедия MHH PЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com ahrn

Форма выпуска:

 \Diamond **Сироп** густой, коричневого цвета, с ароматным запахом.

	100 г
жидкий экстракт чабреца	12 г
калия бромид	1 r

Вспомогательные вещества: сахароза 64% раствор - 82 г, этанол 95% 4.06 г, вода очищенная 0.94 г.

- 100 г флаконы стеклянные.
- 100 г флаконы стеклянные (1) пачки картонные.
- 125 г флаконы стеклянные.
- 125 г флаконы стеклянные (1) пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Экстракт травы чабреца оказывает отхаркивающее действие, увеличивает количество секреторного отделяемого слизистых оболочек верхних дыхательных путей, способствует разжижению мокроты и ускорению ее эвакуации. Бромид калия снижает возбудимость центральной нервной системы.

Показания к применению:

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний; трахеитов, бронхитов, а также у детей при коклюше.

Относится к болезням:

- Коклюш
- Острые респираторные заболевания
- Трахеит

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия, хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации), дефицит сахарозы/изомальтозы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (до 3 лет).

С осторожностью: сахарный диабет; детский возраст старше 3 лет (в связи с наличием этанола в препарате).

Способ применения и дозы:

Препарат принимается внутрь, после еды (в связи с возможностью снижения аппетита).

Взрослым по 1 столовой ложке 3 раза в день;

детям от 3 до 6 лет - по ?-1чайной ложке 3 раза в день:

детям от 6 до 12 лет - по 1-2 чайные ложки 3 раза в день;

детям старше 12 лет - по 1 десертной ложке 3 раза в день.

Курс лечения 10-14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, изжога.

Передозировка:

В случае передозировки препарата возможна тошнота. Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат содержит 8-11% этанола. Содержание абсолютного спирта составляет: в 1 чайной ложке (5 мл) до 0.43 г, в 1 десертной ложке (10 мл) - до 0.87 г, в 1 столовой ложке (15 мл) - до 1.3 г. В максимальной суточной дозе препарата для взрослых - 3 столовые ложки (45 мл) - содержится до 3.9 г абсолютного этилового спирта.

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, работе с движущимися механизмами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

<u>Указание для больных сахарным диабетом:</u> содержание сахарозы в 1 чайной ложке (5 мл) препарата соответствует примерно 0.32 XE, в 1 десертной ложке (10 мл) - примерно 0.64 XE; в 1 столовой ложке - примерно 0.96 XE.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте (до 3 лет).

С осторожностью: детский возраст старше 3 лет (в связи с наличием этанола в препарате).

Условия хранения:

В сухом месте при температуре от 12 до 15°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности. 4 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Pertussin-Ch