

[Пертуссин \(раствор\)](#)



Код АТХ:

- [R05CA10](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Калия бромид](#)
- [Тимьяна ползучего травы экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения.

Трава чабреца оказывает отхаркивающее действие, увеличивает количество секреторного отделяемого слизистой оболочкой верхних дыхательных путей, способствует разжижению мокроты и ускорению ее выведения. Калия бромид снижает возбудимость ЦНС.

Показания к применению:

В качестве отхаркивающего лекарственного средства: ОРЗ, трахеит, бронхит; коклюш.

Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Коклюш](#)
- [Трахеит](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность;
- беременность;

Пертуссин (раствор)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

— период лактации.

Способ применения и дозы:

Внутрь. Взрослым - 1 ст. ложка, детям (в зависимости от возраста) - от 1/2 ч. ложки до 1 дес. ложки 3 раза в день.

Побочное действие:

Аллергические реакции, изжога.

Передозировка:

Симптомы: тошнота.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Сироп содержит сахар, что необходимо учитывать пациентам с сопутствующим сахарным диабетом.

Применение в детском возрасте

Детям (в зависимости от возраста) - от 1/2 ч.ложки до 1 дес.ложки 3 раза в день

Источник: http://drugs.thead.ru/Pertussin_rastvor