

[Пихтовое Масло](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Масло для наружного применения	1 упаковка
масло пихты	100 %

30 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
50 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - банки оранжевого стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Пихтовое масло представляет собой природную смесь борнилацетата, монотерпеновых углеводов, борнеола и сесквитерпенов. Оказывает противовоспалительное, обезболивающее и местно-раздражающее действие.

Показания к применению:

В качестве местного обезболивающего средства у взрослых

- при болевом синдроме, обусловленном заболеваниями нервной системы (радикулит, неврит, плексалгии, невралгии);
- при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артралгии, артрит, миозит, синовит и др.);
- в период обострений и в целях профилактики обострений.

В спортивной медицине

- в качестве согревающего массажного средства;
- в случаях растяжения сухожилий и мышц.

Относится к болезням:

- [Артралгия](#)

- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Болевой синдром](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)
- [Радикулит](#)
- [Синовит](#)

Противопоказания:

- острые инфекционные заболевания;
- опухоли периферической нервной системы;
- кожные заболевания (дерматиты бактериальной, грибковой и вирусной этиологии и др.);
- нарушение целостности кожных покровов;
- беременность, период лактации;
- повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

Наружно. Пихтовое масло наносят на кожу в области болевых ощущений и втирают легкими круговыми движениями в течение 2-3 мин. Затем накладывают компрессную бумагу и закрывают теплой шерстяной тканью на несколько часов, лучше на ночь. Лечебный эффект усиливается, если перед нанесением местно используют сухое тепло. Применяют ежедневно, в течение 2-10 дней, курс лечения повторяют через 1 - 2 недели.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции в виде умеренного покраснения кожи.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано во время беременности и в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

При применении пихтового масла следует избегать попадания на слизистую оболочку глаз. Препарат не следует применять на поврежденную кожу (ссадины, раны и др.).

Условия хранения:

В сухом защищенном от снега и недоступном для детей месте. Срок годности - 2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Pihtovoe_Maslo