

[Пиковит форте](#)



Код АТХ:

- [A11BA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Таблетки, покрытые оболочкой** от светло-оранжевого до темно-оранжевого цвета, круглые, двояковыпуклые; допускаются вкрапления.

	1 таб.
ретинола пальмитат концентрат* (вит. А)	2.94 мг
α-токоферола ацетат 50% гранулят** (вит. Е)	30 мг
колекальциферол концентрат*** (вит. D ₃)	400 мкг
аскорбиновая кислота (вит. С)	60 мг
тиамина мононитрат (вит. В ₁)	1.5 мг
рибофлавин (вит. В ₂)	1.7 мг
кальция пантотенат (вит. В ₅)	10 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. В ₆)	2 мг
фолиевая кислота (вит. В ₉)	400 мкг
цианокобаламин 0.1% в маннитоле (вит. В ₁₂)	6 мг
никотинамид (вит. РР)	20 мг

Вспомогательные вещества: маннитол, аспартам, ароматизатор Мандарин, полисорбат 80, глицерол, масло касторовое, мальтитол (в процессе производства используется мальтитол в виде 75% раствора), магния стеарат, воск эмульсионный (Капол Фарма 600), повидон, кремния диоксид коллоидный безводный, титана диоксид (E171), бетакаротен (E160a).

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

* - ретинола пальмитат концентрат, масляная форма, синтетический (1.7 Mio ME/г) содержит: ретинола пальмитат, бутилгидроксианизол, бутилгидрокситолуол.

** - α-токоферола ацетат 50% гранулят содержит: 50% DL-α-токоферол в желатино-углеводной матрице.

*** - колекальциферол концентрат, масляная форма, (1 Mio ME/г) содержит: колекальциферол, DL-α-токоферол, триглицериды среднецепочные жирных кислот.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Поливитамины. Таблетки Пиковит форте содержат 11 наиболее важных витаминов в количествах, соответствующих рекомендуемой суточной дозе для детей в возрасте старше 7 лет.

Витамины группы В (В₁, В₂, В₆, В₁₂, пантотеновая кислота и никотинамид) участвуют в метаболизме углеводов, белков и жиров.

Фолиевая кислота (витамин В₉) необходима для нормального синтеза, регенерации и функционирования клеток крови.

Ретинол (витамин А) необходим для развития эпителиальных клеток и синтеза зрительного пигмента.

Колекальциферол (витамин D) регулирует поступление кальция и способствует правильной минерализации костей и зубов.

Аскорбиновая кислота (витамин С) способствует абсорбции железа и принимает участие во многих окислительно-восстановительных процессах в организме.

Токоферол (витамин Е) является физиологическим антиоксидантом, защищающим мембраны клеток и поддерживающим функцию клеток.

Пиковит форте не содержит сахар.

Фармакокинетика

Водорастворимые витамины (группы В, С) хорошо абсорбируются в количествах, соответствующих суточным потребностям организма. Количества, превышающие уровень насыщения тканей, выводятся с мочой, иногда с калом. Регулярное применение этих витаминов важно для поддержания необходимых концентраций в тканях, поскольку они накапливаются в организме в ограниченных количествах.

После приема внутрь жирорастворимые витамины А и D хорошо абсорбируются в тонкой кишке в присутствии жиров. Абсорбция витамина Е довольно слабая (25-85% дозы).

Показания к применению:

Препарат рекомендуется к применению у детей в возрасте 7 лет и старше при повышенной потребности организма в витаминах:

- снижение концентрации внимания на фоне повышенного утомления у детей школьного возраста;
- повышенные физические нагрузки (в т.ч. при занятиях спортом);
- повышенная потребность в витаминах на фоне сниженного аппетита;
- в составе комплексной терапии заболеваний при назначении антибиотиков;
- повышенная потребность в витаминах при сниженном сезонном потреблении овощей и фруктов.

Противопоказания:

- гипервитаминоз А;
- гипервитаминоз D;

- детский возраст до 7 лет;
- фенилкетонурия (в связи с наличием в составе препарата аспартама, содержащего фенилаланин);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Таблетки следует держать во рту до полного рассасывания.

Детям в возрасте 7 лет и старше назначают по 1 таб. 1 раз/сут после еды.

При плохом аппетите ребенку следует давать по 1 таб./сут в течение 2 месяцев.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции. В таких случаях следует прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

В связи с наличием в таблетках Пиковит форте 0.6 г мальтитола при применении в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно развитие диареи.

Передозировка:

При передозировке, развивающейся на фоне приема препарата в высоких дозах, более 1 месяца, возможно развитие гипервитаминоза витаминов А и D.

Длительное применения витамина B₆ в высоких дозах может вызвать развитие периферической невропатии.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о безопасности применения препарата при беременности и в период грудного вскармливания не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные по лекарственному взаимодействию препарата Пиковит форте не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

При необходимости одновременного с Пиковитом форте применения других поливитаминных препаратов следует проконсультироваться у врача.

Пациенты с сахарным диабетом могут принимать таблетки Пиковит форте, но следует помнить, что 1 таблетка содержит 0.6 г мальтитола. Для метаболизма мальтитола необходим инсулин, хотя благодаря медленному гидролизу и всасыванию в ЖКТ, потребность в инсулине мала. Энергетическая ценность 1 таблетки составляет приблизительно 6 кДж (1.4 ккал).

Применение в детском возрасте

Противопоказано применение препарата у **детей в возрасте младше 7 лет**.

Детям в возрасте 7 лет и старше назначают по 1 таб. 1 раз/сут после еды.

При плохом аппетите ребенку следует давать по 1 таб./сут в течение 2 месяцев.

Условия хранения:

Пиковит форте

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света, сухом месте при температуре не выше 30°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Pikovit_forte