Пиковит (сироп)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поливитамины

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сироп для детей*** в виде густой, вязкой жидкости, от светло-желтого до коричневато-оранжевого цвета, с запахом цитрусовых и кислым вкусом; допустимо присутствие едва видимых включений.

	5 мл
ретинол (в форме пальмитата) (вит. A)	900 МЕ
колекальциферол (вит. D_3)	100 МЕ
аскорбиновая кислота (вит. C)	50 мг
тиамина гидрохлорид (вит. B_1)	1 мг
рибофлавин (в форме натрия фосфата) (вит. B_2)	1 мг
декспантенол (D-пантенол) (вит. B_5)	2 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. B_6)	600 мкг
цианокобаламин (вит. B_{12})	1 мкг
никотинамид (вит. PP)	5 мг

Вспомогательные вещества: агар, камедь трагакантовая, сахароза, декстроза (глюкоза) жидкая, масло апельсиновое, ароматизатор грейпфрутовый, ароматизатор апельсиновый, полисорбат 80 (твин 80), лимонной кислоты моногидрат, краситель пунцовый (Понсо 4R) (E124), натрия бензоат, вода очищенная.

150 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с дозирующей ложкой - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Поливитаминный препарат. Содержит комплекс витаминов, являющихся важными факторами метаболических

процессов в организме.

Ретинол (витамин А) участвует в синтезе различных веществ (белков, липидов, мукополисахаридов) и обеспечивает нормальную функцию кожи, слизистых оболочек, а также органа зрения.

Колекальциферол (витамин D_3) играет важную роль в поддержании баланса кальция и фосфора в организме. При его недостатке в костной ткани уменьшается содержание кальция (остеопороз).

Тиамин (витамин B_1) нормализует деятельность сердца и способствует нормальному функционированию нервной системы.

Рибофлавин (витамин B_2) способствует регенерации тканей, в т.ч. клеток кожи.

Пиридоксин (витамин B_6) способствует поддержанию структуры и функции костей, зубов, десен; оказывает влияние на эритропоэз, способствует нормальному функционированию нервной системы.

Цианокобаламин (витамин B_{12}) участвует в эритропоэзе, способствует нормальному функционированию нервной системы.

Витамины группы В участвуют в образовании различных ферментов, которые регулируют обмен веществ в организме.

Аскорбиновая кислота (витамин С) участвует в окислении ряда биологически активных веществ, регуляции обмена в соединительной ткани, углеводного обмена, свертываемости крови и регенерации тканей, стимулирует образование стероидных гормонов, нормализует проницаемость капилляров. Витамин С повышает устойчивость организма к инфекциям, снижает воспалительные реакции.

Никотинамид (витамин РР) и D-пантенол (витамин B_5) - коферменты, участвующие в метаболизме белка, синтезе жирных кислот и холестерина, продуцировании энергии и необходимы для нормального функционирования ЦНС.

Показания к применению:

Препарат применяют у детей в качестве профилактического средства при состояниях, сопровождающихся повышением потребности в витаминах:

— переутомление у детей школьного возраста;

— повышенная физическая и нервно-психическая нагрузка;

— при отсутствии аппетита и нерегулярном, неполноценном или однообразном рационе питания;

— в период выздоровления после перенесенных заболеваний, для повышения сопротивляемости организма к инфекционным и простудным заболеваниям.

В составе комплексной терапии при применении химиотерапевтических средств.

Относится к болезням:

- Инфекции

Противопоказания:

— сахарный диабет (Пиковит сироп для детей содержит 3 г сахара в 5 мл сиропа);

— гипервитаминоз А и D;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь.

Детям в возрасте от 1 до 3 лет рекомендуется назначать по 1 чайной ложке сиропа 2 раза/сут (10 мл сиропа в сутки).

Детям в возрасте от 4 до 6 лет - по 1 чайной ложке сиропа 3 раза/сут (15 мл сиропа в сутки).

Детям в возрасте от 7 до 14 лет - по 1 чайной ложке 3-4 раза/сут (15-20 мл сиропа в сутки).

Сироп можно давать с ложечки или смешивать с чаем, соком или фруктовым пюре.

При отсутствии аппетита сироп следует применять ежедневно в течение 1 месяца. Повторный курс приема - через 1-3 месяца, необходимость уменьшения или увеличения интервала между курсами врач решает индивидуально.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

При применении Пиковита не следует превышать рекомендованную суточную дозу. При случайном приеме высокой дозы требуется немедленная консультация врача.

Передозировка:

Случаев передозировки препаратом отмечено не было.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Витамин С усиливает действие и побочные эффекты противомикробных средств из группы сульфаниламидов (в т.ч. появление кристаллов в моче).

Особые указания и меры предосторожности:

На фоне применения возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что не имеет клинического значения и объясняется наличием в препарате рибофлавина.

Не рекомендуется принимать Пиковит совместно с другими препаратами, содержащими витамины.

5 мл сиропа Пиковит содержит 3.3 г сахарозы, 0.7 г глюкозы, поэтому препарат не рекомендован детям с врожденной непереносимостью глюкозы и фруктозы, с синдромами мальабсорбции глюкозы/галактозы и дефицита сахаразы/изомальтазы.

Препарат содержит азокраситель Е124, который может вызвать реакцию повышенной чувствительности с астматическим компонентом. Подобные реакции чаще отмечаются у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте.

Бензойная кислота обладает слабораздражающим действием на кожу и слизистые оболочки.

Применение в детском возрасте

Детям в возрасте от 1 до 3 лет рекомендуется назначать по 1 чайной ложке сиропа 2 раза/сут (10 мл сиропа в сутки).

Детям в возрасте от 4 до 6 лет - по 1 чайной ложке сиропа 3 раза/сут (15 мл сиропа в сутки).

Детям в возрасте от 7 до 14 лет - по 1 чайной ложке 3-4 раза/сут (15-20 мл сиропа в сутки).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Pikovit_sirop