

## Пимафуцин



### Код АТХ:

- [A07AA03](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Натамицин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой** белого или почти белого цвета, круглые.

	<b>1 таб.</b>
натамицин	100 мг

*Вспомогательные вещества:* крахмал картофельный - 79.2 мг, повидон К30 - 5 мг, магния стеарат - 2.5 мг, лактозы моногидрат - 66 мг.

*Состав оболочки:* целлацефат - 18 мг, триацетин - 2.7 мг, сахароза - 122 мг, метилпарагидроксибензоат - 0.07 мг, кальция карбонат - 30 мг, каолин - 14.2 мг, тальк - 21.7 мг, титана диоксид - 3 мг, акации камедь - 7.3 мг, желатин - 3.3 мг, воск пчелиный белый - 0.13 мг.

20 шт. - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

## Фармакодинамика

Противогрибковый полиеновый (тетраеновый) антибиотик из группы макролидов. Оказывает преимущественно фунгицидное действие. Натамицин необратимо связывается с эргостерином клеточной мембраны клетки гриба, что ведет к нарушению ее целостности, потере содержимого цитоплазмы и гибели клетки.

К натамицину *чувствительны* большинство патогенных дрожжевых и плесневых грибов, включая роды *Candida*, *Aspergillus*, *Serphalosporium*, *Fusarium* и *Penicillium*. *Менее чувствительны* к натамицину дерматофиты и *Pseudoallescheria boydii*. Случаев резистентности к натамицину в клинической практике не отмечено.

Натамицин в лекарственной форме таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, действует только в просвете кишечника.

## Фармакокинетика

При приеме внутрь натамицин практически не абсорбируется из ЖКТ и не оказывает системного действия.

## Показания к применению:

- кандидоз кишечника;
- острый псевдомембранозный и острый атрофический кандидоз у пациентов с кахексией, иммунной недостаточностью, а также после терапии антибиотиками, кортикостероидами, цитостатиками;
- санация кишечного резервуара грибов рода *Candida* при кандидозе кожи и слизистых оболочек, в т.ч. при кандидозных вагинитах, вульвитах и вульвовагинитах.

## Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Вульвит](#)
- [Кахексия](#)

## Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь. Прием пищи не оказывает влияния на эффективность препарата.

При кандидозе кишечника **взрослым** рекомендуется принимать 100 мг (1 таб.) 4 раза/сут, детям - 100 мг (1 таб.) 2 раза/сут. Средняя продолжительность курса лечения - 1 неделя.

При упорном течении вагинитов, вызванных грибами рода *Candida*, совместно с местными противогрибковыми препаратами (например, суппозиториями Пимафуцин) для санации очага кандидозной инфекции в кишечнике применяют таблетки Пимафуцин (внутри по 100 мг (1 таб.) 4 раза/сут в течение 10-20 дней).

Продолжительность курса лечения устанавливают индивидуально. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжать лечение еще несколько дней.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* возможны тошнота, диарея (возникающие в первые дни приема препарата и проходящие самостоятельно в ходе лечения).

Пациента следует предупредить о том, что если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или он заметил любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует сообщить об этом врачу.

## Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Пимафуцин не сообщалось.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Возможно применение Пимафуцина при беременности и в период лактации.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие препарата Пимафуцин с другими лекарственными препаратами не обнаружено.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Пациентам с редкой врожденной непереносимостью галактозы, фруктозы, дефицитом лактазы larr, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или сахарозно-изомальтазной недостаточностью необходимо принимать во внимание, что препарат содержит лактозы моногидрат (66 мг) и сахарозу (122 мг). Если пациент страдает одним из перечисленных заболеваний, перед приемом таблеток Пимафуцин обязательно следует проконсультироваться с врачом.

Пимафуцин в данной лекарственной форме не рекомендуется для применения у **детей грудного возраста** ввиду возможного затруднения при проглатывании таблеток.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Пимафуцин не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

### **Применение в детском возрасте**

Пимафуцин в данной лекарственной форме не рекомендуется для применения у детей грудного возраста ввиду возможного затруднения при проглатывании таблеток.

Детям назначают по 100 мг (1 таб.) 2 раза/сут.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

4 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Pimafucin>