Пимафуцин



Код АТХ:

- A07AA03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Натамицин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой*** белого или почти белого цвета, круглые.

	1 таб.
натамицин	100 мг

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 79.2 мг, повидон K30 - 5 мг, магния стеарат - 2.5 мг, лактозы моногидрат - 66 мг.

Состав оболочки: целлацефат - 18 мг, триацетин - 2.7 мг, сахароза - 122 мг, метилпарагидроксибензоат - 0.07 мг, кальция карбонат - 30 мг, каолин - 14.2 мг, тальк - 21.7 мг, титана диоксид - 3 мг, акации камедь - 7.3 мг, желатин - 3.3 мг, воск пчелиный белый - 0.13 мг.

20 шт. - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковый полиеновый (тетраеновый) антибиотик из группы макролидов. Оказывает преимущественно фунгицидное действие. Натамицин необратимо связывается с эргостерином клеточной мембраны клетки гриба, что ведет к нарушению ее целостности, потере содержимого цитоплазмы и гибели клетки.

К натамицину *чувствительны* большинство патогенных дрожжевых и плесневых грибов, включая роды Candida, Aspergillus, Cephalosporium, Fusarium и Penicillium. *Менее чувствительны* к натамицину дерматофиты и Pseudoallescheria boydii. Случаев резистентности к натамицину в клинической практике не отмечено.

Натамицин в лекарственной форме таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, действует только в просвете кишечника.

Фармакокинетика

При приеме внутрь натамицин практически не абсорбируется из ЖКТ и не оказывает системного действия.

Показания к применению:

— кандидоз кишечника;

— острый псевдомембранозный и острый атрофический кандидоз у пациентов с кахексией, иммунной недостаточностью, а также после терапии антибиотиками, кортикостероидами, цитостатиками;

— санация кишечного резервуара грибов рода Candida при кандидозе кожи и слизистых оболочек, в т.ч. при кандидозных вагинитах, вульвитах и вульвовагинитах.

Относится к болезням:

- Вагинит
- Вульвит
- Кахексия

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь. Прием пищи не оказывает влияния на эффективность препарата.

При *кандидозе кишечника* **взрослым** рекомендуется принимать 100 мг (1 таб.) 4 раза/сут, детям - 100 мг (1 таб.) 2 раза/сут. Средняя продолжительность курса лечения - 1 неделя.

При *упорном течении вагинитов, вызванных грибами рода Candida*, совместно с местными противогрибковыми препаратами (например, суппозиториями Пимафуцин) для санации очага кандидозной инфекции в кишечнике применяют таблетки Пимафуцин (внутрь по 100 мг (1 таб.) 4 раза/сут в течение 10-20 дней).

Продолжительность курса лечения устанавливают индивидуально. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжать лечение еще несколько дней.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: возможны тошнота, диарея (возникающие в первые дни приема препарата и проходящие самостоятельно в ходе лечения).

Пациента следует предупредить о том, что если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или он заметил любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует сообщить об этом врачу.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Пимафуцин не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение Пимафуцина при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Пимафуцин с другими лекарственными препаратами не обнаружено.

Особые указания и меры предосторожности:

Пациентам с редкой врожденной непереносимостью галактозы, фруктозы, дефицитом лактазы lapp, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или сахаразно-изомальтазной недостаточностью необходимо принимать во внимание, что препарат содержит лактозы моногидрат (66 мг) и сахарозу (122 мг). Если пациент страдает одним из перечисленных заболеваний, перед приемом таблеток Пимафуцин обязательно следует проконсультироваться с врачом.

Пимафуцин в данной лекарственной форме не рекомендуется для применения у **детей грудного возраста** ввиду возможного затруднения при проглатывании таблеток.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Пимафуцин не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Применение в детском возрасте

Пимафуцин в данной лекарственной форме не рекомендуется для применения у детей грудного возраста ввиду возможного затруднения при проглатывании таблеток.

Детям назначают по 100 мг (1 таб.) 2 раза/сут.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Pimafucin