Пимафуцин (крем)

Код АТХ:

- A07AA03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Натамицин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Крем для наружного применения 2%*** от белого до светло-желтого цвета.

	1 г
натамицин	20 мг

Вспомогательные вещества: воск цетилэфирный, децилолеат (цетиол V), натрия лаурилсульфат, пропиленгликоль, пропилпарагидроксибензоат, метилпарагидроксибензоат, цетостеариловый спирт, вода очищенная.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
30 г - тубы пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковый полиеновый антибиотик из группы макролидов, имеющий широкий спектр действия. Оказывает

фунгицидное действие. Натамицин связывает стеролы клеточной мембраны клетки гриба, нарушая ее целостности и функции, что приводит к гибели клетки.

К натамицину *чувствительны* большинство патогенных дрожжевых грибов, особенно Candida albicans.

Менее чувствительны к натамицину дерматофиты.

Резистентность к натамицину в клинической практике не отмечена.

Фармакокинетика

При нанесении на кожу и слизистые оболочки практически не подвергается системной абсорбции, поэтому не оказывает системного действия.

Показания к применению:

— грибковые заболевания кожи и слизистых оболочек, вызванные чувствительными к препарату возбудителями (в т.ч. вагиниты, вульвиты, вульвовагиниты, баланопоститы, вызванные грибами рода Candida; кандидоз кожи и ногтей; наружный отит, либо первично вызванный грибами, либо осложнившийся кандидозом; дерматомикозы).

Относится к болезням:

- Баланит
- Вагинит
- Вульвит
- Дерматит
- Кандидоз кожи

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

При *дерматомикозах (в т.ч. кандидозах кожи, опрелостях у детей)* крем наносят на пораженную поверхность кожи один или несколько (до 4-х) раз в сутки.

При *микозе наружного слухового прохода* пораженную поверхность смазывают кремом один или несколько раз (до 4 раз) в сутки. Перед применением препарата ухо очищают. После применения препарата в слуховой проход помещают тампон из натурального материала (хлопка, шерсти).

При *вульвите, вульвовагините, баланопостите* крем наносят на пораженные участки кожи один или несколько раз в сутки.

Продолжительность курса лечения устанавливают индивидуально. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжать лечение еще несколько дней.

Побочное действие:

Местные реакции: возможны легкое раздражение, ощущение жжения.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Пимафуцин не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение Пимафуцина при беременности и в период лактации.

Данные о неблагоприятном воздействии на плод отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Пимафуцин не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

В случае хронической или рецидивирующей инфекции местное лечение может быть дополнено назначением Пимафуцина в форме таблеток.

Использование в педиатрии

Крем для наружного применения Пимафуцин можно назначать новорожденным.

Применение в детском возрасте

Крем Пимафуцин можно назначать детям и новорожденным.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Pimafucin_krem