Пимафукорт



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Гидрокортизон
- Натамицин
- Неомицин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Крем для наружного применения*** от белого до белого с желтоватым оттенком цвета.

	1 г
натамицин	10 мг
неомицин (в форме сульфата)	3500 ЕД
гидрокортизон микронизированный	10 мг

Вспомогательные вещества: натрия цитрат - 14 мг, эмульгатор F - 115 мг, сорбитана стеарат - 30 мг, воск цетилэфирный - 60 мг, цетиол V - 150 мг, макрогола стеарат 100 - 20 мг, метилпарагидроксибензоат - 2 мг, пропилпарагидроксибензоат - 0.5 мг, вода очищенная - до 1 г.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
15 г - тубы пластиковые (1) - пачки картонные.

◊ ***Мазь для наружного применения*** от белого до желтого цвета.

	1 г
натамицин	10 мг
неомицин (в форме сульфата)	3500 ЕД
гидрокортизон микронизированный	10 мг

Вспомогательные вещества: полиэтиленовая мазевая основа (95% парафин жидкий, 5% полиэтилен) - 976.5 мг.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
15 г - тубы пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывающий антибактериальное, противогрибковое и местное противовоспалительное действие за счет компонентов, входящих в его состав.

Натамицин относится к полиеновым антибиотикам группы макролидов, оказывает фунгицидное действие. *Активен в отношении* дрожжевых и дрожжеподобных грибов (особенно Candida spp.). Дерматомицеты менее чувствительны к натамицину.

Неомицин является антибиотиком широкого спектра действия из группы аминогликозидов, *активен в отношении грамположительных бактерий:* Staphylococcus spp., Enterococcus spp.; *грамотрицательных бактерий:* Klebsiella spp., Proteus spp., Escherichia coli и других.

Гидрокортизон обладает противовоспалительным и сосудосуживающим действием. Устраняет воспалительные явления и зуд, сопровождающие различные виды дерматозов.

Фармакокинетика

Натамицин и неомицин практически не абсорбируются через неповрежденную кожу и слизистые оболочки. Возможна абсорбция неомицина через поврежденную кожу, при нанесении на обширные раневые и ожоговые поверхности.

Через неповрежденную кожу абсорбируется от 1 до 3% гидрокортизона; при дерматите количество абсорбируемого гидрокортизона увеличивается в 2 раза, при инфекционных поражениях кожи может возрастать в 5 раз.

У детей абсорбция гидрокортизона через неповрежденную кожу выше, чем у взрослых. Степень абсорбции препарата в системный кровоток с возрастом уменьшается.

Показания к применению:

— дерматозы, поддающиеся терапии ГКС, осложненные вторичной бактериальной и/или грибковой инфекцией (особенно вызванной Candida spp.).

Относится к болезням:

- Дерматит
- Инфекции

Противопоказания:

— туберкулез кожи;

— кожные проявления сифилиса;

— вирусные инфекции кожи;

— кожные поствакцинальные реакции;

— открытые раны;

— язвенные поражения кожи;

— угревая болезнь;

— розацеа;

— ихтиоз;

— аногенитальный зуд;

— опухоли кожи;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат при системном туберкулезе, у пациентов с указаниями в анамнезе на поражение IX пары ЧМН на фоне применения аминогликозидов. При наличии перфорации барабанной перепонки и прямом воздействии неомицина на среднее ухо существует риск ототоксического действия.

Способ применения и дозы:

Взрослым и **детям** препарат наносят на пораженные участки кожи 2-4 раза/сут. **Детям** препарат следует наносить на ограниченные участки кожи и не применять окклюзионные повязки.

Продолжительность лечения определяется индивидуально с учетом характера заболевания, курс лечения обычно не превышает 14 дней. При отсутствии улучшения состояния у детей и взрослых спустя 14 дней следует проконсультироваться у врача.

Препарат в форме крема рекомендуется для терапии *острых и подострых дерматозов*.

Препарат в форме мази предназначен для терапии *подострых и хронических дерматозов*, особенно при наличии выраженной сухости кожи, лихенификации или в тех случаях, когда необходимы окклюзионные свойства мази.

Побочное действие:

Побочные эффекты при наружном применении Пимафукорта развиваются редко и носят обратимый характер.

Аллергические реакции: редко - зуд, жжение, покраснение или сухость кожи.

Дерматологические реакции: крайне редко - атрофия и истончение кожи, телеангиэктазии, стрии, пурпура, розацеаподобный и периоральный дерматит, замедление заживления ран, депигментация, гипертрихоз, синдром отмены после прекращения лечения; контактный дерматит на неомицин.

Системные реакции: при наружном применении ГКС в течение длительного времени на обширных участках кожи, или при использовании окклюзионных повязок, особенно у детей, возможно развитие побочных эффектов, обусловленных системным действием ГКС - симптомы подавления функции коры надпочечников.

Передозировка:

Сведений о передозировке препарата нет. Существует теоретическая возможность ототоксического действия неомицина в случае нанесения препарата на область слухового прохода при наличии перфорации барабанной перепонки и прямом воздействии неомицина на среднее ухо.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При применении Пимафукорта при беременности необходимо учитывать теоретический риск ототоксического действия неомицина, в связи с чем нельзя наносить препарат на обширные участки поверхности кожи, нельзя применять препарат длительно, применять его под окклюзионные повязки.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Пимафукорт не описано.

Возможна перекрестная гиперчувствительность между неомицином и препаратами сходной химической структуры, например канамицином, паромомицином, гентамицином и перекрестная устойчивость между неомицином и другими антибиотиками группы аминогликозидов.

Особые указания и меры предосторожности:

При нанесении Пимафукорта на область век и периорбитальную область существует риск увеличения внутриглазного давления, развития катаракты.

В случае продолжительного лечения, при наличии ран и язв существует теоретический риск ототоксического и нефротоксического действия неомицина.

При появлении суперинфекции или чрезмерном развитии грибковой микрофлоры следует прекратить применение препарата и принять соответствующие меры.

Использование в педиатрии

С осторожностью следует назначать препарат **детям в возрасте до 1 года**.

У детей препарат следует применять под контролем врача. При применении препарата на обширных поверхностях или под окклюзионными повязками необходимо иметь в виду возможность подавления функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы.

Применение в детском возрасте

С осторожностью следует назначать препарат детям в возрасте до 1 года.

У детей препарат следует применять под контролем врача. При применении препарата на обширных поверхностях или под окклюзионными повязками необходимо иметь в виду возможность подавления функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы.

Детям препарат следует наносить на ограниченные участки кожи и не применять окклюзионные повязки.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности крема - 3 года. Срок годности мази - 5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Pimafukort