

Пиносол



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Спрей назальный** в виде прозрачной бесцветной или со слегка желтоватым оттенком маслянистой жидкости со специфическим запахом.

	1 л
масло сосны горной	35 г
масло мяты	10 г
масло эвкалиптовое	5 г
α-токоферола ацетат	15 г
гимол	300 мг

Вспомогательные вещества: триглицериды среднецепочные - до 1 л.

10 мл - флаконы темного стекла (1) с насосом-дозатором и адаптером под назальное впрыскивание - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противоконгестивное средство растительного происхождения. Оказывает противовоспалительное, противоотечное действие, уменьшает вязкость секрета слизистой оболочки дыхательных путей. Проявляет антибактериальную активность в отношении некоторых штаммов грамположительных и грамотрицательных бактерий (*Streptococcus ruogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Micrococcus luteus*, *Bacillus cereus*, *Escherichia coli*), а также противогрибковый эффект в отношении дрожжевых и плесневых грибков (*Candida albicans*, *Aspergillus niger*).

Фармакокинетика

В соответствии с Международной конвенцией (ЕМЕАНPWG11/99) при проведении клинических исследований препаратов растительного происхождения не требуется изолированное исследование фармакокинетических параметров.

Показания к применению:

- острые и хронические риниты неаллергической этиологии;
- ринофарингит;
- инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки носа и носоглотки.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)
- [Ринит](#)
- [Ринофарингит](#)

Противопоказания:

- аллергический ринит;
- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат впрыскивают по 1 дозе в каждый носовой ход 3-6 раз/сут, в зависимости от выраженности воспалительного процесса. Для этого снимают предохранительный колпачок насоса-дозатора, легким нажатием пальцев впрыскивают препарат и закрывают насос-дозатор предохранительным колпачком.

Перед применением препарата после снятия защитного колпачка насоса-дозатора следует легким нажатием пальцев сделать 2 пробных впрыскивания (не в нос!).

Курс лечения составляет 10 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

В редких случаях: аллергические реакции, легкое жжение, зуд, отечность слизистой оболочки носовой полости.

Передозировка:

До настоящего времени явления передозировки не наблюдались.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные по безопасности применения препарата Пиносол при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

До начала лечения препаратом Пиносол необходимо проверить индивидуальную реакцию пациента на препарат

Пиносол

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

после однократной его инстилляции в нос. В случае развития аллергических реакций прием препарата следует отменить.

После использования следует всегда закрывать насос-дозатор колпачком.

Применение в детском возрасте

Препарат назначают детям старше **3 лет**.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Pinosol>