

[Пиносол \(капли\)](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капли назальные** в виде прозрачной жидкости от синего до зелено-синего цвета, с ментолово-эвкалиптовым запахом.

	10 мл
масло эвкалиптовое	50 мг
масло сосны обыкновенной	372.5 мг
масло мяты перечной	100 мг
тимол	3.2 мг
гвайазулен	2 мг
α-токоферола ацетат	170 мг

Вспомогательные вещества: бутилоксанизол, лабрафил М, рапсовое масло.

10 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, в состав которого входит смесь эфирных масел с натуральными веществами в растительном масле. Препарат оказывает противовоспалительное, противомикробное действие, усиливает грануляцию. Пиносол улучшает состояние больного, облегчая носовое дыхание за счет снижения секреции и повышения проходимости носовых ходов. При хроническом течении заболевания препарат усиливает кровообращение слизистой оболочки носа, гортани, трахеи и способствует восстановлению ее функции.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Пиносол не предоставлены.

Показания к применению:

- острый ринит;
- хронический атрофический ринит;
- острые и хронические воспалительные заболевания слизистых оболочек носа и носоглотки, сопровождающиеся сухостью слизистой оболочки;
- при состояниях после оперативного вмешательства в полости носа (в условиях стационара и амбулаторно).

Относится к болезням:

- [Ринит](#)

Противопоказания:

- аллергический ринит;
- детский возраст до 2 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым в 1-й день препарат закапывают по 1-2 капли в каждую ноздрю с интервалом 1-2 ч. В последующие дни - по 1-2 капли в каждую ноздрю 3-4 раза/сут.

Возможно применение препарата в виде ингаляций, которые следует проводить при помощи ингалятора. Для этого 2 мл (50 капель) закапывают в ингалятор; кратность применения - 2-3 раза/сут.

Детям закапывают по 1-2 капли 3-4 раза/сут или используют ватный тампон.

Препарат применяют в течение 5-7 дней.

Побочное действие:

Местные реакции: зуд, чувство жжения, гиперемия и отек слизистой оболочки полости носа.

Передозировка:

При местном применении вероятность развития передозировки препарата Пиносол маловероятна.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение Пиносола при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Пиносол не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Пациента следует информировать о том, что при развитии побочных реакций следует обратиться к врачу.

Применение в детском возрасте

Пиносол (капли)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Детям старше 2 лет закапывают по 1-2 капли 3-4 раза/сут или используют ватный тампон.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Pinosol_kapli