Пиперазин



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Пиперазина адипинат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогельминтное средство. Оказывает парализующее действие на нематоды, нарушая функцию их нервно-мышечной системы.

Показания к применению:

Аскаридоз, энтеробиоз.

Относится к болезням:

- Энтерит
- Энтеробиоз

Противопоказания:

Органические заболевания ЦНС, повышенная чувствительность к пиперазина адипату.

Способ применения и дозы:

При аскаридозе принимают в течение 2 дней подряд по 2 раза/сут за 1 ч до или через 0.5-1 ч после еды в следующих дозах:

Возраст пациента	Разовая доза
Взрослые	1.5-2 г
Дети:	
13-15 лет	1.5 г
9-12 лет	1 г
6-8 лет	750 мг
4-5 лет	500 мг
2-3 года	300 мг
до 1 года	200 мг

Возможно также применение в течение одного дня: однократно от 400 мг до 4 г (в зависимости от возраста) или 2 раза от 200 мг до 2 г. При энтеробиозе применяют в тех же дозах в течение 5 дней подряд, проводят 1-3 цикла лечения с 7-дневным перерывом. В перерывах между циклами рекомендуется назначать на ночь клизму (для удаления остриц из прямой кишки): взрослым - из 4-5 стаканов воды, детям - из 1-3 стаканов воды (с добавлением натрия гидрокарбоната по 1/2 чайной ложки на стакан воды).

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, боли в животе.

Со стороны ЦНС: преходящая головная боль. У больных с почечной недостаточностью препарат может вызывать нейротоксические осложнения. При передозировке возможны тремор и мышечная слабость.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение пиперазина адипата не требует предварительной подготовки больных и назначения специальной диеты. Слабительные средства назначают лишь при склонности к запорам (в дни приема пиперазина вечером). При лечении энтеробиоза необходимо строгое соблюдение гигиенического режима.

Источник: http://drugs.thead.ru/Piperazin